


تولید مثل : یکی از ویژگیهای موجودات زنده است که برای بقای نسل انجام می شود. اعمالی مانند تغذیه، تنفس و ... به زنده بودن خود جاندار کمک می کند ولی تولید مثل به زندگی خود جاندار ربطی ندارد.



تولید مثل جنسی : برای انجام شدن تولید مثل در چنین جاندارانی به دو فرد یا دو نوع سلول جنسی نر و ماده نیاز است.

تولید مثل غیر جنسی : برای تولید مثل غیر جنسی وجود یک فرد کافی است.

دونیم شدن : در این روش جاندار بعد از این که به اندازه کافی رشد کرد از وسط به دو نیم تقسیم می شود در این حالت هر نیمه، یک سلول کامل است که بعد از رشد می تواند به همین روش تقسیم و تکثیر شود. باکتری ها به این روش تولید مثل می کنند.

جوانه زدن : در این روش ابتدا یک برآمدگی در بدن جاندار ایجاد می شود و سپس این برآمدگی بزرگ شده و به جاندار جدیدی تبدیل می شود. این روش هم در تک سلولی ها (مخمر) و هم در پرسلوی ها (هیدر) دیده می شود.

نکته ۱ : به هر یک از این برآمدگی ها که به تدریج بزرگ می شوند، **جوانه** می گویند.

قطعه قطعه شدن : در این روش یک قطعه از بدن جاندار موجود جدید و کاملی ایجاد می کند. مثلاً گیاه خزه انسهاب هایی دارد که اگر جدا شوند، هریک از آنها رشد، و یک گیاه خزه ایجاد می کند.

هاگ زایی : کپک روی نان و میوه ها نمونه ای از جاندارانی است که با تولید سلول هایی به نام هاگ زیاد می شود. هاگ در صورتی که در جای مناسب قرار گیرد، رشد می کند و جانداری مانند والد خود به وجود می آورد.

هاگ : سلول (یاخته) کوچک، سبک و مقاومی است که همراه با هوا و آب پخش می شود. هاگ ها در هاگدان تشکیل می شوند.

تشکیل سلول (یاخته) تخم : فرد نر، گامت (کامه) نر و فرد ماده، گامت (کامه) ماده تولید می کند که از ترکیب گامت نر و گامت ماده سلول تخم به وجود می آید.

لقاء: به ترکیب شدن گامت(کامه) نر و ماده لقاء می گویند.

تقسیم میوز (کاستمان): به تقسیمی گفته می شود که طی آن تعداد کروموزوم های(فامتن) سلول نصف می شود. در این تقسیم هم مانند میتوز (رشتمان) قبل از تقسیم کروموزوم ها(فامتن) ۲ برابر می شوند ولی در تقسیم میوز هر سلول به ۴ سلول تبدیل می شود به همین دلیل تعداد کروموزوم ها نصف می شود.

تفاوت تقسیم میتوز و میوز (رشتمان و کاستمان):

| تقسیم میوز (رشتمان) | تقسیم میوز (کاستمان) |
|---|---|
| از یک سلول ۲ سلول به دست می آید | از یک سلول ۴ سلول به دست می آید |
| تعداد کروموزوم ها با تعداد کروموزوم های سلول اولیه برابر است | تعداد کروموزوم ها نصف تعداد کروموزوم های سلول اولیه است |
| در همه اندام های بدن روی می دهد | در اندام های جنسی روی می دهد |
| هدف ترمیم و رشد بافت های بدن | هدف تولید سلول های جنسی |
| | |

نکته ۲: گامتهاي(کامه) ماده (تخمک) از گامتهاي نر(اسپرم يا زامه) بزرگتر هستند چون آنها باید بعد از لقاء تا مدتی غذای سلول تخم را فراهم کنند. البته تفاوت اندازه تخمک و اسپرم مربوط به سیتو پلاسم است چون اندازه هسته در هر دو يكسان است.

نکته ۳: اسپرم ها معمولاً دارای یک دم هستند که با کمک آن حرکت کرده و خود را به تخمک می رسانند.

انواع لقاء:

۱- داخلی: گامت(کامه) ماده و اسپرم (زامه) درون بدن جانور ماده ترکیب می شوند.

۲- خارجی: گامت(کامه) ماده و اسپرم (زامه) در خارج از بدن جانور ماده ترکیب می شوند.


تفاوت لقاء خارجی و داخلی:

| نوع لقاء | مکان لقاء | تعداد گامت(کامه) | امنیت گامتها(کامه) و فرزندان | مثال |
|----------|-----------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| داخلی | داخل بدن | گامت ماده کم گامت نر زیاد | زیاد | خرندهگان، پوندهگان، پستانداران |
| خارجی | داخل آب | گامت نر زیاد گامت ماده زیاد | کم | دوزیستان، ماهی ها |

رَحِم: در بیشتر پستانداران بخشی از بدن مادر به رشد و نمو جنین اختصاص دارد. این بخش رَحِم نامیده می شود.

بند ناف: بند ناف با رگ های خونی ای که دارد، بین جنین و دستگاه گردش خون مادر ارتباط ایجاد می کند یعنی بند ناف، مواد غذی و اکسیژن را از مادر به جنین می رساند و مواد دفعی جنین را نیز به بدن مادر می برد.

نکته ۴: در انسان تولید اسپرم (زامه) از سن بلوغ آغاز می شود ولی تخمرک ها در دوران جنینی تولید می شوند و زمانی که فرد به بلوغ برسد این تخمرک ها کامل شده و هر ماه یکی از آنها از تخدمان آزاد می شود.



دو قلو های همسان و غیر همسان: اگر دو عدد تخمرک با دو اسپرم لقاح پیدا کنند دو قلو های غیر همسان تولید می شوند ولی اگر یک سلول تخم در مرحله اولیه بعد از لقاح به دو قسمت مجزا تقسیم شود هر کدام از این قسمت ها تبدیل به یک جنین می شوند و چون هر دو از یک سلول تخم به وجود آمده اند جنین ها هم کاملا مشابه هم یعنی همسان خواهند بود.

تولید مثل در گیاهان گلدار:




نکته ۵: گل اندام تولید مثل جنسی گیاهان گلدار است.

نکته ۶: مادگی بخش ماده و پرچم بخش نر گل را تشکیل می دهند.

نکته ۷: گامت های (کامه) ماده در تخمرک ها و گامت (کامه) نر در دانه های گرده به وجود می آیند.

گرده افسانی: به قرار گرفتن دانه های گرده روی مادگی گل قرار می گویند.

تشکیل سلول تخم: هنگام گرده افسانی لوله ای از دانه گرده تشکیل می شود که گامت (کامه) نر را به سمت گامت (کامه) ماده می برد. تخم از ترکیب گامت های نر و ماده تشکیل می شود.



نکته ۸: جاندارانی که از طریق تولید مثل جنسی به وجود آمده اند نیمی از ژنهای خود را از یک فرد (پدر) و نیمی از ژنهایشان را از فرد دیگر (مادر) دریافت می کنند به همین دلیل این افراد تفاوت های زیادی با هم دارند و احتمال سازگاری آنها با محیط بیشتر است.