

"با کمال امتنان، پذیرای پیشنهادها و نظرهای علمی و ادبی عزیزان هستیم."

سریلند باشید-پورسالار-آذر ۱۴۰۰

با ویراستاری و همکاری استاد محمد حجت پناه-دزفول

@BioSalar_Ch

بخش چهارم



و آن لیس لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سعى

و اینکه برای انسان، بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست.

سوره نجم، آیه ۳۹

انرژی نیاز همیشه

انرژی موضوع هیجان‌انگیزی است و این امکان را فراهم می‌کند تا شما بتوانید برخیزید و راه بروید؛ فکر کنید؛ گیاهان رشد کنند و موتورها توان لازم را برای به حرکت درآوردن اتومبیل‌ها یا هواپیماها به دست آورند. انرژی به شکل‌های متفاوتی وجود دارد و مهمترین ویژگی آن، تبدیل آسان از شکلی به شکل دیگر است. انرژی نیاز همیشگی بشر است و بر سر منابع آن تاکنون جنگ‌های بسیاری به راه افتاده است. با وجود این هر روزه مقدار زیادی انرژی تلف می‌کنیم!

فصل ۸—انرژی و تبدیل‌های آن

فصل ۹—منابع انرژی

فصل ۱۰—گرما و بهینه‌سازی انرژی

"با کمال امتنان، پذیرای پیشنهادها و نظرهای علمی و ادبی عزیزان هستیم."

سربلند باشید-پورسالار-آذر ۱۴۰۰

با ویراستاری و همکاری استاد محمد حجت پناه-دزفول

@BioSalar_Ch

فصل ۸

انرژی و تبدیل‌های آن

۱. مهم‌ترین ویژگی انرژی چیست؟ ۲. انرژی در کجا وجود دارد؟ چگونه به وجود انرژی پی می‌بریم؟



یکی از مهم‌ترین مفاهیم تمام شاخه‌های علوم که همواره در زندگی خود با آن سروکار داریم، انرژی است. آیا می‌دانید مطالعه و شناخت این مفهوم چه اهمیتی برای ما دارد؟ انرژی یکی از پرکاربردترین مفاهیم در علوم است. (مهم‌ترین ویژگی انرژی، قابلیت تبدیل آن از یک شکل به شکل دیگر است.) در این فصل خواهیم دید (انرژی در «همه چیز و همه جا» وجود دارد؛ اما وقتی به وجود آن بی می‌بریم که منتقل یا تبدیل شود) انتقال انرژی با انجام کار صورت می‌گیرد. در این فصل ابتدا با کار و سپس با انرژی و ویژگی‌های آن آشنا می‌شویم.

کار و انرژی

در زبان روزمره فعالیت‌هایی همچون دویدن، ضربه‌زدن^۱ و گرفتن توپ در زمین فوتبال را «بازی کردن» می‌گوییم؛ اما نشستن در پشت میز، خواندن کتاب، نوشتن و اندیشیدن را «کار کردن» می‌نامیم.

فعالیت

به فهرست زیر، جمله‌هایی اضافه کنید که واژه کار در آنها معنای متفاوتی داشته باشد.

- امروز خیلی کار دارم.
- من در یک شرکت تولید بازی‌های رایانه‌ای کار می‌کنم.
-
-

نکته: کارهای عنوان شده در جملات بالا قابل اندازه گیری نیستند؛ اما با توجه به مفهوم علمی آن، کار قابل اندازه گیری می‌باشد.

فکر کنید


در علوم، مفهوم کار را چنان تعریف می‌کنیم که اندازه‌گیری آن ممکن باشد. به نظر شما کار انجام شده در کدامیک از جمله‌های فعالیت صفحه قبل قابل اندازه‌گیری است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه کار انجام شده را اندازه می‌گیرید؟
نیروی وارد بر جسم به بوسیله نیروسنجه و با واحد نیوتون و جابجایی را توسط متر و با واحد مترا اندازه‌گیری می‌کنیم سپس با استفاده از رابطه کار، مقدار آن را بدست می‌آوریم.

آزمایش کنید

وسایل و مواد: نیروسنجه، متر یا خطکش و دو قطعه چوب (یا آجر)

روش آزمایش

- ۱- نیروسنجه را به یکی از چوب‌ها وصل کنید که روی سطح افقی یک میز فوار دارد (شکل الف).
- ۲- چوب را به آرامی توسط نیروسنجه بکشید تا به مقدار دلخواه (مثلًا ۳۰ سانتی‌متر) جابه‌جا شود.
- ۳- هنگام حرکت جسم به نیروسنجه نگاه کنید و مقدار نیروی وارد شده بر قطعه آجر را بخوانید و در جدول زیر وارد کنید.
- ۴- مراحل ۲ و ۳ را برای حالتی که قطعه چوب ۵ سانتی‌متر جابه‌جا می‌شود، تکرار کنید.
- ۵- اکنون دو قطعه چوب را مطابق شکل (ب) روی یکدیگر قرار دهید و مراحل ۲ و ۳ را برای آن تکرار کنید. در این آزمایش نیز باید سعی کنید تا اجسام به آرامی و با سرعت ثابتی جابه‌جا شوند.



نیرو (N) نیرو × جابه‌جایی = کار	جابه‌جایی (m)	نیرو (N)	جابه‌جایی × نیرو = کار
ژول ۵×۰/۳۰=۱/۵	۰/۳۰	۵	آزمایش اول (با یک قطعه چوب)
	۰/۵۰		
۰/۱۵	۰/۱۵		آزمایش دوم (با دو قطعه چوب)
	۰/۲۵		

در آزمایش بالا دیدید که وقتی به جسمی نیرو وارد می‌کنیم و جسم به آرامی جابه‌جا می‌شود به سادگی می‌توانیم مقدار نیرو و جابه‌جایی را اندازه‌گیریم. همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم در علوم نیز کار را به صورتی تعریف می‌کنیم تا بتوانیم مقدار آن را از طریق اندازه‌گیری عامل‌های مؤثر در آن به دست آوریم.

یکی از عامل‌های مؤثر در انجام کار، نیرویی است که به جسم وارد می‌شود. برای یادآوری آنچه در علوم سال ششم در خصوص مفهوم نیرو و اثرهای آن آموختید به شکل ۱ توجه کنید.

۱. عوامل موثر بر انجام کار کدامند؟ ۱- نیرو ۲- جابجایی

از آزمایش بالا دو نکته زیر مشخص می‌شود:
نکته ۱: دو عامل در اندازه‌گیری کار موثر است، نیرو و جابجایی.

نکته ۲: نیرو بوسیله نیروسنجه و با واحد نیوتون، اما جابجایی بوسیله متر و با واحد متر قابل اندازه‌گیری می‌باشدند.


۱. مفهوم کار چیست؟

۲. اثرهای نیرو بر یک جسم را بنویسید.

شکل ۱-۲ (وارد کردن نیرو به یک جسم ممکن است سبب

- (الف) شروع حرکت آن شود.
- (ب) سرعان تر شدن حرکت آن شود.
- (پ) گذشتندن حرکت آن شود.
- (ت) توقف حرکت آن شود.
- (ث) تغییر شکل آن شود.
- (ج) تغییر جهت حرکت آن شود.

۲)




علاوه بر نیروی وارد شده به جسم، جا به جایی یا تغییر مکان جسم نیز یکی دیگر از عامل های

مهم در انجام کار است: به این ترتیب می توان گفت: «(هنجا)می کار انجام می شود که نیروی وارد شده به جسم، سبب جا به جاشدن آن شود» (شکل ۲). در شکل (الف) نیروی افقی سبب جا به جایی افقی و در شکل (ب) نیروی عمودی سبب جا به جایی عمودی جسم شده است.



جیمز ژول در اوایل قرن نوزدهم در منچستر انگلستان به دنیا آمد. ژول آزمایش های بسیاری انجام داد تا درک بهتری از مفهوم انرژی به دست آورد و همچنین ماشین هایی بسازد که کارایی پیشتری داشته باشند. یکای انرژی در دستگاه بین المللی یکاها به پاس خدمات علمی وی، ژول انتخاب شده است.



شکل ۲ - انجام دادن کار در دو حالت مختلف؛ توجه کنید که نیرو و جا به جایی در یک جهت اند.

در این کتاب تنها به تعریف کار برای حالتی می پردازیم که مشابه آزمایشی که انجام دادید، مقدار نیروی وارد شده به جسم ثابت باشد و جسم در جهت نیرو جا به جا شود (شکل ۲). در این صورت کار انجام شده روی جسم با رابطه زیر تعریف می شود:

۳. کار از چه رابطه ای بدست می آید؟


۴. یکا(واحد) اندازه گیری کار، نیرو

$$W = F \times d$$

(در این رابطه نیرو بر حسب نیوتون (N)، جا به جایی بر حسب متر (m) و کار بر حسب ژول (J))

اندازه گیری و بیان می شوند.)

مثال:



شکل رو به رو، وزنه برداری را نشان می دهد که با وارد کردن نیروی $N = 2000$ ، وزنه ای را به آرامی تا ارتفاع $1/5 m$ بالای سرش جا به جا می کند. کار انجام شده توسط این وزنه بردار چقدر است؟ حل :

با توجه به فرض های مسئله داریم :

نیروی وارد شده به وزنه از طرف وزنه بردار : 2000 نیوتون

تذکر: وقتی وزنه بردار، وزنه را برای چند ثانیه یا بیشتر بالای سرخود نگه می دارد چون وزنه جا به جا نمی شود، کاری صورت نمی گیرد (کار=۰). در این شرایط نیرو وجود دارد ولی چون جا به جایی صفر است حاصل ضرب نیرو و جا به جایی (کار) نیز صفر می شود.

تذکر: منشاً نیروی شخص از انرژی شیمیایی ذخیره شده در بدن شخص است و به صورت انرژی گرمایی در دیوار و بدن او تبدیل می‌شود.

جابه‌جایی وزنه در جهت نیروی وارد شده به آن: $1/5$ متر
با جایگذاری این مقادیر در رابطه کار داریم:

$$\text{کار} = \text{نیرو} \times \text{جهت} = 2000 \text{ N} \times 1/5 \text{ m} = 2000 \text{ J}$$




شکل ۳- شخصی در حال هل دادن
دیوار خانه‌ای
کار =

نیروی که دست شخص به جعبه وارد می‌کند.



کار =
جهت جابه‌جایی شخص

شکل ۴- وقتی نیرو بر جهت جابه‌جایی عمود باشد، کاری انجام نمی‌دهد.



$$\text{کار} = 225 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 450 \text{ J}$$

اصل کار: کارگرفته شده = کارداده شده

$$50 \times 2 = 100 \times 1$$

۲. چند شکل (صورت) را نام ببرید.

در علوم ششم آموختید که انرژی به شکل‌های گوناگون مانند انرژی حرکتی، گرمایی، نورانی، صوتی و شیمیایی وجود دارد و می‌تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود (شکل ۵).

۳. در هر یک از موارد زیر چه تبدیل انرژی انجام می‌گیرد؟



(ا)

(ب)

(الف)

- شکل ۵-(الف) انرژی شیمیایی سوخت
به انرژی حرکتی کشته تبدیل می‌شود.
ب) انرژی شیمیایی ذخیره شده در جوب
به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل
می‌شود.
پ) انرژی الکتریکی وارد شده به
تلویزیون به انرژی نورانی، انرژی صوتی و
انرژی گرمایی تبدیل می‌شود(۳)

۱. انرژی را تعریف کنید. به توانایی انجام کار انرژی گفته می شود.

۲. انواع انرژی را نام ببرید. انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل

فعالیت


عبارت‌های زیر را با استفاده از جعبه کلمه‌ها کامل کنید. هر واژه ممکن است یک بار یا بیش از یک بار استفاده شود یا هیچ استفاده‌ای از آن نشود.



گرمایی - صوتی - الکتریکی - شیمیایی - جنبشی - نورانی

الف) در یک رادیو، بخش زیادی از انرژی الکتریکی به انرژی... صوتی ... تبدیل می‌شود.

ب) در یک چراغ قوه، انرژی... شیمیایی... ذخیره شده در باتری به انرژی... الکتریکی تبدیل می‌شود. پس از آن لامپ، انرژی... الکتریکی را به انرژی... نورانی... و انرژی... گرمایی... تبدیل می‌کند.



شكل ۶- هر جسمی که حرکت کند، انرژی جنبشی دارد.

۳. منظور از انرژی جنبشی چیست؟ به چه عواملی بستگی دارد؟

وقتی تویی را پرتاپ کنیم، توپ شروع به حرکت می‌کند (شکل ۶). در این صورت تا هنگامی که توپ در حرکت است، انرژی حرکتی دارد. ^۳ معمولاً انرژی حرکتی را، انرژی جنبشی می‌نامند. انرژی جنبشی هر جسم، به جرم جسم و مقدار سرعت آن بستگی دارد؛ یعنی هرچه جسمی سنگین‌تر باشد و تندتر حرکت کند، انرژی جنبشی بیشتری دارد.

فکر کنید

در هریک از حالت‌های زیر انرژی جنبشی (حرکتی) دو جسم را با هم مقایسه کنید.

الف) در شکل زیر هر دو اتومبیل مشابه‌اند، ولی اتومبیل سبز رنگ تندتر از اتومبیل قرمزرنگ حرکت می‌کند. اتومبیل سبز انرژی جنبشی بیشتری دارد زیرا سرعت آن بیشتر است.



ب) در شکل زیر اتومبیل و کامیون با یک سرعت حرکت می‌کنند.




کامیون انرژی جنبشی بیشتری دارد زیرا جرم آن بیشتر است.

پورسالار

قضیه کار و انرژی:

تغییر انرژی جنبشی جسم = کار انجام شده روی جسم

فعالیت



در این قسمت توپ به اجسامی که در مسیرش قرار دارند، برخورد و کردن نیرو به توپ و جایه جایی آن، روی توپ کار انجام می‌دهد.

در این قسمت توپ به اجسامی که در آنها نیرو وارد می‌کند. این نیرو سبب جایه جایی اجسام می‌شود. درنتیجه گفته می‌شود، توپ روی این اجسام کار انجام داده است.

با توجه به شکل رو به رو، هر یک از عبارت‌های زیر را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

الف) اگر روی جسمی کار انجام دهیم، می‌تواند انرژی جنبشی به دست آورد. جسمی که انرژی جنبشی داشته باشد، می‌تواند کار انجام دهد.

ب) کار، انرژی را منتقل می‌کند.

انرژی می‌تواند ذخیره شود


تا اینجا دیدیم که انجام دادن کار روی یک جسم می‌تواند انرژی جنبشی آن را تغییر دهد؛

اما در ادامه خواهیم دید که همیشه این گونه نیست؛ به عبارت دیگر می‌توان روی یک جسم کار انجام داد بدون اینکه انرژی جنبشی آن تغییر کند.

۱. جمله‌های مناسب برای سوالات درست و نادرست؟

۲. برای مثال، کتابی را در نظر بگیرید که به آرامی و با سرعت ثابت از طبقه پایین کتابخانه‌ای به

طبقه بالای آن جایه جا می‌کنیم (شکل ۷-الف). به نظر شما در این حالت کار انجام شده روی کتاب به چه شکلی از انرژی تبدیل شده است؟ باسخ این است که «کار انجام شده» روی کتاب به شکل **انرژی پتانسیل گرانشی** ذخیره شده است. توجه کنید که در طول مسیر انرژی جنبشی کتاب تغییری نکرده است.



شکل ۷-الف - کار انجام شده روی یک جسم می‌تواند به شکل **انرژی پتانسیل گرانشی** در آن ذخیره شود.

آزمایش کنید نکته: انجام دادن کار روی یک جسم می‌تواند انرژی جنبشی آن را تغییر دهد؛ یا به شکل انرژی پتانسیل گرانشی در آن ذخیره شود.

وسایل و مواد: چند گلوله به **جرم‌های متفاوت**، یک قطعه نخ و یک تکه چوب

روش آزمایش ۳. منظور از آونگ چیست؟

۱- هرگاه یک سر قطعه نخ را به گلوله‌ای وصل کنیم و سر دیگر نخ را همانند شکل رو به رو از نقطه‌ای آویزان کنیم به مجموعه نخ و گلوله، آونگ گفته می‌شود.

۲- همانند شکل رو به رو یک قطعه چوب را در مسیر حرکت آونگ قرار دهید.


۳- آونگ را از وضعیت قائم منحرف و رها کنید. پس از برخورد گلوله آونگ به قطعه چوب، جایه جایی آن را اندازه بگیرید.

۴- آزمایش را به ازای چند ارتفاع گلوله نسبت به سطح زمین انجام دهید و جایه جایی قطعه چوب را پس از برخورد گلوله آونگ با آن یادداشت کنید.

۵- آزمایش را برای گلوله‌های دیگری با جرم متفاوت تکرار کنید و نتایج

حاصل را در گروه خود به بحث بگذارید و به کلاس ارائه کنید.

مقدار جایه جایی قطعه چوب با تغییر جرم و یا ارتفاع گلوله تغییر می‌کند؛ به این شکل که هرچه جرم و یا ارتفاع گلوله بیشتر شود، جایه جایی قطعه چوب بیشتر می‌شود.



در نقطه ۱ توب به سمت بالا پرتاب شده است و به دلیل داشتن جرم و سرعت، دارای انرژی جنبشی است؛ اما چون ارتفاعش صفر است، انرژی پتانسیل گرانشی ندارد. در ادامه مسیر هرچه توب به سمت بالا می‌رود، به دلیل کاهش سرعت و افزوده شدن ارتفاعش از انرژی جنبشی آن کم می‌شود و به انرژی پتانسیل آن اختلاف می‌گردد. در نقطه ۴ گلوه لحظه بسیار کوتاه متوقف می‌شود که در این لحظه به دلیل صفر شدن سرعت، انرژی جنبشی ندارد و همچنین به دلیل نهایت ارتفاعی که دارد، تمام انرژی در توب به صورت پتانسیل گرانشی است. در حرکت توب به سمت پایین از مقادیر انرژی پتانسیل کاسته شده و به انرژی جنبشی اختلاف می‌گردد. یا افزایش سرعت و کاهش ارتفاع، لحظه ای قبل از برخورد توب به زمین انرژی توب تمام جنبشی است چون بیشترین سرعت را در آن جا دارد و همچنین به لیل صفر بودن ارتفاع انرژی پتانسیل گرانشی صفر است. اما در لحظه برخورد (نقطه ۷) انرژی جنبشی توب به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود (از اصطکاک هوا و تلف اشدن انرژی قلل از برخورد به زمین، صرفنظر شده است).

آیا می‌دانید

زردیبی (تاندون) آشیل که در پشت با قرار دارد، همانند یک فنر طبیعی عمل می‌کند. این زردیبی (تاندون) با کشیده شدن و سپس رهاشدن، انرژی پتانسیل کشسانی را ذخیره و سپس آزاد می‌کند. این عمل فنر گونه، مقدار فعالیتی را که عضله‌های پا هنگام دویدن باید انجام دهند، کاهش می‌دهد.



۱. انرژی پتانسیل (ذخیره) گرانشی به چه عواملی بستگی دارد؟


همان‌طور که از آزمایش قبل نتیجه گرفتیم، (انرژی پتانسیل گرانشی به وزن جسم و ارتفاع)

جسم از سطح زمین وابسته است.

$$\text{ارتفاع} \times \text{وزن} = \text{انرژی پتانسیل}$$

$$U = mg \times h$$

با توجه به شکل، انرژی پتانسیل گرانشی جسم به ارتفاع آن از سطح زمین بستگی دارد و به مسیری که برای رسیدن به این ارتفاع پیموده است، بستگی ندارد.



دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیم انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل گرانشی

و تبدیل انرژی بیان کنید.

هنگام بالا بردن سنگ، انرژی جنبشی به انرژی پتانسیل تبدیل می‌شود. هرچه ارتفاع جسم (به شرط یکسان بودن جرم) بیشتر باشد انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود. (سمت راست). سپس با رها کردن سنگ، انرژی پتانسیل



۲. منظور از انرژی پتانسیل شیمیایی و کشسانی چیست؟

انرژی پتانسیل به جز شکل گرانشی، شکل‌های دیگری نیز دارد. (انرژی ذخیره شده در انواع سوخت‌ها و مواد غذایی از نوع انرژی پتانسیل شیمیایی) است. همچنین هرگاه یک نوار لاستیکی یا یک فنر را بکشیم، انرژی پتانسیل کشسانی در آن ذخیره می‌شود (شکل ۷-ب). وقتی نوار لاستیکی یا فنر را رها می‌کنیم، انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شده در آن می‌تواند به شکل انرژی جنبشی آزاد شود.

تذکر: توجه شود که شکل‌های دیگر انرژی هم حالت پتانسیلی دارند؛ برای نمونه پتانسیل حرکتی، پتانسیل الکتریکی، هسته ای و ...

- ۱- انرژی پتانسیل گرانشی
- ۲- انرژی پتانسیل شیمیایی
- ۳- انرژی پتانسیل کشسانی



شکل ۷-ب - کمان کشیده شده دارای انرژی پتانسیل کشسانی است. با رها کردن زده (کشش) کمان، انرژی پتانسیل ذخیره شده به انرژی جنبشی تیر تبدیل می‌شود.

۱. با مثالی نشان دهید که در انجام کار شکل های انرژی به یکدیگر تبدیل می شوند.
(در پرتاب یک توپ چه تبدیل های انرژی صورت می پذیرد؟)

مقدار کل انرژی ثابت می ماند

در این فصل آموختید که (کار انجام شده روی یک جسم سبب می شود شکلی از انرژی به شکلی دیگر تبدیل شود؛ برای مثال وقتی توپ را پرتاب می کنیم، انرژی شیمیایی ذخیره شده در بدن ما به انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل گرانشی توپ تبدیل می شود). همان طور که دیده می شود، حتی در یک فعالیت ساده چندین تبدیل انرژی وجود دارد.

وقتی در هر ثانیه مقداری انرژی الکتریکی، مثلاً 1 جول ، به یک لامپ روشنایی داده شود، باید در هر ثانیه همان مقدار انرژی نورانی و گرمایی از لامپ خارج شود (شکل ۸).

نکته: مقدار انرژی مصرفی یا تولید شده هرسیله در واحد زمان (ثانیه) نشان دهنده توان آن بر حسب وات است.

ازرژی الکتریکی از بازی به لامپ داده می شود.



$$\frac{\text{انرژی یا کار مفید}}{\text{انرژی یا کار کل}} = \frac{1}{100} \times 100 = \text{بازده لامپ}$$

$$\frac{1}{10} = 10\% = \text{بازده لامپ}$$

شکل ۸—تبدیل انرژی در یک مدار الکتریکی ساده

بازی ازرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

۲. منظور از قانون پایستگی انرژی چیست؟

بررسی انواع مختلف انرژی و تبدیل آن از شکلی به شکل دیگر به یکی از بزرگ ترین قانون ها در فیزیک به نام **قانون پایستگی انرژی** انجامیده است که تاکنون هیچ استثنایی برای آن دیده نشده است. این قانون به شکل زیر بیان می شود :

۲) انرژی هرگز به وجود نمی آید یا از بین نمی رود. تنها شکل آن تغییر می کند و مقدار کل آن ثابت می ماند)

خود را بیازمایید

با توجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالی را روی نمودار انرژی یک خودرو کامل کنید.

$300\text{ جول به انرژی جنبشی (حرکتی)}$
تبدیل می شود



$$\frac{300}{1200} = 25\% = \text{بازده موتور خودرو}$$

۱. بدن ما در کدام موقع به انرژی نیاز دارد؟ مثال بزنید.

۲. مقدار انرژی مورد نیاز بدن در فعالیت های مختلف را مقایسه کنید.

بدن ما به انرژی نیاز دارد ۳. بدن ما انرژی مورد نیاز برای انجام فعالیت ها را چگونه بدست می آورد؟



شکل ۴-۹ (شش های ما اکسیژن هوا را می گیرند. قلب با عمل تلمبه ای، اکسیژن خون و همچنین غذای جذب شده در خون را به جاهای مورد نیاز بدن می رساند) ۴

۴. نقش شش ها و قلب چیست؟

۱) بدن ما در همه موقع به انرژی نیاز دارد. موقع راه رفتن، دویدن، خنیدن و صحبت کردن انرژی مصرف می کنیم. وقتی آرام نشسته ایم، بدن ما در حال مصرف انرژی است؛ حتی موقع خواب هم انرژی مصرف می کنیم.^۱ (وقتی خوابیم، بدن ما انرژی مصرف می کند تا قلب و شش های ما به کار ادامه دهند (شکل ۹)؛ اما وقتی پیدار می شویم، انرژی بیشتری مصرف می کنیم. بعضی کارها مثل دویدن، پریدن یا کارهای سخت به انرژی زیادی نیاز دارند)^۲

۳) بدن ما انرژی مورد نیاز این فعالیت ها را از مواد غذایی که می خوریم به دست می آورد^۳ (شکل ۱۰).



جدول ۱— انرژی موجود در برخی از خوراکی ها بر حسب کیلوژول بر گرم

انرژی	خوراکی
۲/۹	سیب زمینی
۵	غلات
۹/۳	بسنتی (وانیلی)
۱۱/۳	نان لوаш
۱۶/۸	شکر
۱۸	کیک (ساده)
۳۲/۲	روغن نباتی
۱/۸	شیر کم چرب
۳	شیر پر چرب
۵	حبوبات
۶/۷	مرغ
۶/۸	تخم مرغ (آب پز)
۰/۹	گوجه فرنگی
۲/۴	سیب
۳/۶	موز

۵. انرژی ذخیره شده در خوراکی ها به چه شکلی است؟ واحد اندازه گیری انرژی ذخیره شده خوراکی ها چیست؟ شکل ۱۰ مثال بزنید.

در علوم ششم دیدیم که^۴ (انرژی ذخیره شده در خوراکی ها به شکل انرژی شیمیایی است و مقدار آن را می توان با واحد کیلوژول (kJ) یا کیلو کالری (kcal) بیان کرد؛^۵ به این ترتیب می توان گفت^۶ در هر گرم از غذایی که می خوریم، مقداری انرژی شیمیایی نهفته است که معمولاً آن را با یکای کیلوژول بر گرم (kJ/g) بیان می کنند؛ برای مثال، وقتی می گوییم انرژی شیمیایی شیر معمولی ۲/۷ کیلوژول بر گرم است، منظور ما این است که در هر گرم شیر معمولی ۲/۷ کیلوژول انرژی شیمیایی ذخیره شده است.^۷ در جدول ۱ انرژی شیمیایی بعضی از غذاهای آماده مصرف داده شده است.

۷. انرژی خوراکی های بسته بندی شده معمولاً بر حسب چیست؟ رابطه کیلو کالری و ژول چیست؟

۷) معمولاً انرژی خوراکی های بسته بندی شده را بر حسب کیلو کالری می نویسند. هر

کیلو کالری معادل ۴۲۰۰ ژول است؛ به این ترتیب داریم: $1\text{ kcal} = 4200\text{ J}$

خود را بیازماید

مقدار انرژی ای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز (حدود ۶۰ گرم)، یک گوجه فرنگی (حدود ۵۰ گرم) و یک نان لواش (حدود ۱۰۰ گرم) کسب می کند، چقدر است؟



$$\text{کیلوژول بر گرم} = ۱۵۸۳ = (۶۰ \times ۶/۸) + (۱۰۰ \times ۱۱/۳) + (۵۰ \times ۰/۹)$$


پورسالار

$$(سن(سال) \times 6/8) - (قد(سانتیمتر) \times 5) + (\text{جرم(کیلوگرم)} \times 12/75) = \text{مرد}$$

$$(سن(سال) \times 4/7) - (قد(سانتیمتر) \times 1/85) + (\text{جرم(کیلوگرم)} \times 9/56) = \text{زن}$$

فعالیت

فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف می کنید به همراه مقدار تقریبی آنها تهیه کنید. با توجه به این فهرست تعیین



کنید که در این روز معین، بدن شما چه مقدار انرژی از این مواد غذایی کسب می کند.

نکته: برای تعیین انرژی شیمیایی موجود در یک ماده غذایی از دستگاهی مانند شکل زیر استفاده می شود که ژول سنج(کالریمتر) مواد غذایی نامیده می شود. به این منظور، جرم معینی از یک ماده غذایی را درون ظرف کوچکی در پایین دستگاه قرار می دهند. آتش زدن ماده غذایی درون ظرف و عبور اکسیژن از مجاورت آن اجازه می دهد تا ماده غذایی به طور کامل بسوزد با اندازه گیری دمای آب، قبل و بعد از سوزاندن کامل ماده غذایی، مقدار گرمایی که ماده غذایی به آب منتقل کرده است را محاسبه می کنند


فکر کنید

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیمی که در این فصل فرا گرفتید، بیان کنید.

خورشید منبع اصلی انرژی مصرفی است که به طور غیرمستقیم در مواد غذایی به صورت انرژی پتانسیل شیمیایی ذخیره می شود.



نمودار شکل ۱۱، متوسط انرژی مورد نیاز در یک شبانه روز برای افراد مختلف نشان می دهد.^(۱) به طور طبیعی پسران و مردان نسبت به دختران و زنان، کمی بیشتر به انرژی نیاز دارند^(۱) این موضوع در نمودار نیز دیده می شود. ۱. انرژی مورد نیاز افراد مختلف را مقایسه کنید.



شکل ۱۱- انرژی تقریبی مورد نیاز در افراد مختلف در یک شبانه روز

آیا می دانید

بدن ما برای هر یک از فعالیت‌های روزانه، مقدار معینی انرژی مصرف می‌کند. اگر مدت یا سرعت هر فعالیت تغییر کند، مقدار انرژی مصرف شده نیز تغییر خواهد کرد. معمولاً برای بیان مقدار انرژی مصرف شده از کمیتی به نام آهنگ مصرف انرژی استفاده می‌کنند. منظور از این کمیت این است که دریک زمان معین (مثلًا یک دقیقه) چه مقدار انرژی مصرف می‌شود؛ به عنوان مثال، آهنگ مصرف انرژی برای راه رفتن معمولی ۱۶ کیلوژول در دقیقه است و این بدان معناست که برای هر دقیقه راه رفتن معمولی، بدن ما حدود ۱۶ کیلوژول انرژی مصرف می‌کند.

فکر کنید

انرژی مورد نیاز هر فرد به چه عواملی بستگی دارد؟ سن، جرم، قد، جنسیت، شیوه زندگی و سلامت عمومی و میزان فعالیت

انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال و در حال رشد برای یک شبانه روز به طور متوسط بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ کیلوژول است. با توجه به نتیجه خود را بیازماید صفحه قبل، آیا

این وعده غذاهایی برای صباحانه یک نوجوان در سن و سال شما کافی است یا خیر؟

با توجه به اینکه یک نوجوان در حال رشد حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار کیلو ژول انرژی نیاز دارد، ۱۵۸۳ کیلوژول برای یک وعده صباحانه کافی نیست. وقت شود که وعده صباحانه بسیار مهم است و دست کم باید یک سوم انرژی مورد نیاز یک روز (دست کم ۴۰۰۰-۴۰۰۰ کیلوژول) را فراهم کند.

با تشکر ویژه از استاد جواد رمضانی کارشنک



انرژی و تبدیل‌های آن

فصل ۸



در علوم، کار به صورتی تعریف می‌شود که بتوان مقدار آن را از طریق اندازه‌گیری عامل‌های مؤثر بر آن بدست آورد.
کار به دو عامل بستگی دارد.

- ۱- نیرویی که به جسم وارد می‌شود.
- ۲- مسافتی که جسم در اثر آن نیرو حرکت می‌کند.

وارد کردن نیرو ممکن است سبب حرکت، توقف، تغییر اندازه سرعت و تغییر جهت حرکت و تغییر شکل جسم گردد.

رابطه کار عبارت است از:

$$\text{کار} = \text{نیرو} \times \text{جا به جایی}$$

↓ ↓ ↓
 نیوتون (N) نیوتون متر (N.m) متر (m)
 ژول (J)

مثال شخصی برای جابه‌جا کردن یک جعبه به اندازه ۶ متر روی زمین، نیروی افقی به اندازه ۴۰۰ نیوتون به آن وارد می‌کند. کاری که این شخص روی جعبه انجام می‌دهد را بدست آورید.

$$\text{کار} = \text{نیرو} \times \text{جا به جایی}$$

$$= 400 \text{ N} \times 6 \text{ m}$$

$$= 2400 \text{ J}$$

مثال شخصی با نیروی ۴۰۰ N جعبه‌ای به وزن ۶۰۰ N را ۲ متر در امتداد نیروی وارد شده جابه‌جا می‌کند. کار انجام شده را محاسبه کنید.

چون جسم روی زمین در حال کشیده شدن است، پس وزن جسم کاربردی ندارد.

$$\text{جابه‌جایی} \times \text{نیرو} = \text{کار}$$

$$400 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 800 \text{ J} = \text{کار}$$

با توجه به مثال قبل اگر شخص همین جعبه را ۲ متر از سطح زمین بالا ببرد، کار انجام شده چقدر


مثال

خواهد بود؟

برای بلند کردن جسم باید بر تمام وزن آن غلبه کرد.

$$\text{جابه‌جایی} \times \text{نیرو} = \text{کار}$$

$$600 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 1200 \text{ J} = \text{کار}$$



- شخص جسمی را هل می‌دهد ولی جسم حرکت نمی‌کند.



- شخصی وزنه‌ای را بالای سر خود برای مدتی نگه می‌دارد.

- شخص جسمی را در دست نگه داشته و به صورت افقی حرکت می‌کند.

- حرکت فضایپیما یا شهاب‌سنگ در فضای خارج از جو

۱ - اگر جابه‌جایی صفر باشد

کار در چه صورت‌هایی

صفر می‌شود.

۲ - اگر نیرو صفر باشد

انرژی

به توانایی انجام کار، انرژی گویند.

انرژی به شکل‌های گوناگون مانند انرژی حرکتی، گرمایی، نورانی، صوتی و شیمیایی وجود دارد و می‌تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود. وقتی لامپ روشن می‌شود، انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی و نورانی تبدیل می‌شود.

انرژی به دو نوع یافت می‌شود.

الف: جنبشی

ب: پتانسیل



انرژی جنبشی

هرچیزی که حرکت کند، انرژی جنبشی دارد. مثل باد، آب جاری، پرنده در حال حرکت و ...

معمولًا انرژی حرکتی را انرژی جنبشی گویند.
انرژی جنبشی به دو عامل بستگی دارد.

- ۱ - جرم جسم
- ۲ - مقدار سرعت آن

هرچه جرم و سرعت بیشتر باشد، انرژی جنبشی بیشتر خواهد بود.




انرژی پتانسیل

به انرژی ذخیره شده در مواد (انرژی که در ماده نهفته است و در صورت آزاد شدن می‌تواند موجب حرکت شود) انرژی پتانسیل می‌گویند. مثل لامپی که از سقف آویزان است.



برخی از شکل‌های انرژی پتانسیل عبارتند از:

۱- **انرژی پتانسیل گرانشی**: انرژی ذخیره شده در جسمی که از سطح زمین فاصله دارد.



۲- **انرژی پتانسیل کشسانی**: انرژی ذخیره شده در یک نوار لاستیکی کشیده شده یا یک فنر فشرده شده.



۳- **انرژی پتانسیل شیمیایی**: انرژی ذخیره شده در انواع سوخت‌ها و مواد غذایی

نفت خام

انرژی پتانسیل گرانشی به وزن جسم و ارتفاع جسم از سطح زمین وابسته است.

$$\text{ارتفاع جسم از سطح زمین} \times \text{وزن جسم} = \text{انرژی پتانسیل گرانشی}$$

↓
(J) ژول


↓
(N) نیوتن

↓
(m) متر

مثال جسمی به جرم ۲۵ نیوتن در ارتفاع ۱۰ متری سطح زمین قرار دارد. انرژی پتانسیل گرانشی جسم چقدر است؟

ارتفاع جسم از سطح زمین \times وزن = انرژی پتانسیل گرانشی

$$j = 25N \times 10m = 250J$$



تبديل انرژی

کار انجام شده روی یک جسم سبب می‌شود تا شکلی از انرژی به شکل دیگر تبدیل شود.
در حرکت کشتی، انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرکتی کشتی تبدیل می‌شود.

با رها کردن زه (کش) کمان، انرژی پتانسیل ذخیره شده به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود.

قانون پایستگی انرژی: طبق این قانون «انرژی هرگز به وجود نمی‌آید یا از بین نمی‌رود، تنها شکل آن تغییر می‌کند و مقدار کل آن ثابت می‌ماند.»

مثلاً در یک لامپ روشن، انرژی الکتریکی از بین نمی‌رود بلکه به انرژی تابشی و گرمایی تبدیل می‌گردد.



انرژی خوراکی‌ها

بدن ما در همه مواقع به انرژی نیاز دارد. ما از طریق خوردن غذاهای متنوع، انرژی لازم برای فعالیت‌های حیاتی را به دست می‌آوریم.

مقدار غذا و انرژی مورد نیاز هر شخص به سن، جنسیت، فعالیت، جثه و اندازه بدن و ... بستگی دارد.



انرژی ذخیره شده در خوراکی‌ها به شکل انرژی شیمیایی است و مقدار آن با واحد کیلوژول (kJ) یا کیلوکالری (Kcal) بیان می‌شود.

هر کیلوژول برابر 1000 ژول و هر کیلوکالری برابر 1000 کالری است.



هر کالری برابر $4/2 \text{ ژول}$ و هر کیلوکالری برابر 4200 ژول است.

$$1\text{ cal} \approx 4/2\text{ j}$$

$$1\text{ kcal} = 4200\text{ j}$$

در هر گرم غذایی که می‌خوریم، مقداری انرژی شیمیایی نهفته است که معمولاً آن را با یکای کیلوژول برگرم $(\frac{\text{kJ}}{\text{g}})$ بیان می‌کنند.

مثلاً انرژی شیمیایی موجود در شیر معمولی $2/7$ کیلوژول بر گرم است، یعنی در هر گرم شیر معمولی $2/7$ کیلوژول انرژی شیمیایی ذخیره شده است.



جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

۱. هنگامی کار انجام می‌شود که نیروی وارد شده به جسم سبب آن شود.
۲. اگر زاویه بین نیرو و جایه جایی باشد، کار صفر می‌شود.
۳. قانون بیان می‌کند که انرژی تبدیل می‌شود، اما خلق و نابود نمی‌شود.
۴. انرژی ذخیره شده در هر گرم از خوراکی‌ها به صورت انرژی است که مقدار آن را می‌توان با واحد بیان کرد.
۵. مقدار انرژی جنبشی به و بستگی دارد.

”راه آشتبایی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است. ارد بزرگ“

۶. هرگاه لاستیک یا فنر را بکشیم، انرژی ذخیره شده در آن به شکل انرژی در می‌آید.
 ۷. در آب آبشار، انرژی در حال کاهش و انرژی در حال افزایش است.



درست نادرست

درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت‌های زیر را تعیین کنید.


۱. وزنه برداری که وزنه 250 N را روی سر خود به ارتفاع ۲ متر نگه داشته است کاری برابر 500 J انجام داده است.

۲. انرژی پتانسیل گرانشی یک جسم، به جرم، شدت جاذبه و ارتفاع جسم بستگی دارد.

۳. هرچه جسمی سنگین‌تر شود انرژی جنبشی آن کم‌تر می‌شود.

۴. هر کالری معادل $\frac{4}{2}\text{ ژول}$ است.

۵. هر چه جعبه‌ای سریع‌تر روی زمین کشیده شود کار بیش‌تری انجام می‌شود.



پاسخ صحیح را با گذاشتن علامت (✓) در داخل □ مشخص کنید.

۱. کدام گزینه بیانگر واحد کار است؟





د) متر × ژول

ج) نیوتن

ب) نیوتن × ژول

الف) متر × نیوتن

۲. وزنهای را از نزدیکی سطح زمین رها می‌کنیم، نمودار انرژی پتانسیل آن بر حسب ارتفاع کدام است؟



۳. در کدام حالت روی جسم کار انجام شده است؟

الف) علی دیوار را هل می‌دهد.

ج) فرزاد وزنهای را که در دستش داشت رها کرد.

۴. در بوق اتومبیل، چه تبدیل انرژی صورت می‌گیرد؟

الف) الکتریکی به مکانیکی

ج) صوتی به الکتریکی

۵. تبدیل انرژی کدام وسیله با بقیه متفاوت است؟

د) کولر

ج) دینام

ب) ماشین ظرفشویی

الف) آرمیچر

ب) الکتریکی به صوتی

د) شیمیایی به صوتی

ب) محسن کیف را در دستش نگه می‌دارد.

د) رضا وزنهای را بالای سرشن نگه داشت.

ب) الکتریکی به صوتی

د) شیمیایی به صوتی

۶. هوایپیما یی در حال کاهش ارتفاع و فرود است. در این صورت کدام گزینه زیر صحیح می‌باشد؟

ب) فقط انرژی پتانسیل آن کم می‌شود.

ج) انرژی جنبشی و پتانسیل آن هردو کم می‌شود.

د) انرژی جنبشی کم و انرژی جنبشی افزایش می‌یابد.

۷. انرژی موجود در مواد غذایی مانند انرژی کدام‌یک از موارد زیر است؟

د) باد

ب) سنگ در حال سقوط

ج) آب جاری

الف) باروت

۸. وقتی یک نوار لاستیکی کشیده شده را رها کنیم، چه تبدیل انرژی در آن صورت می‌گیرد؟

- ب) پتانسیل گرانشی به پتانسیل کشسانی
 د) پتانسیل کشسانی به جنبشی

- الف) پتانسیل شیمیایی به جنبشی
 ج) پتانسیل کشسانی به پتانسیل کشسانی

۹. انرژی پتانسیل گرانشی در کدام حالت بیشتر است؟



۱۰. با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه تبدیل انرژی را به درستی نشان می‌دهد؟

- الف) نورانی - الکتریکی - شیمیایی - الکتریکی - نورانی و گرمایی
 ب) نورانی - شیمیایی - الکتریکی - شیمیایی - نورانی و گرمایی
 ج) الکتریکی - شیمیایی - الکتریکی - نورانی - گرمایی
 د) گرمایی - الکتریکی - شیمیایی - الکتریکی - نورانی



۱۱. کدام عامل هم در انرژی پتانسیل گرانشی و هم جنبشی موثر است؟

- د) سرعت ب) جرم ج) جاذبه الف) ارتفاع

۱۲. یک سواری پژو سفید با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت، یک سواری پژو مشکی با سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت و یک کامیون با سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت در حرکتند. کدام گزینه مقایسه انرژی جنبشی آن‌ها را درست نشان می‌دهد؟

- ب) پژو مشکی < کامیون < پژو سفید الف) پژو سفید < کامیون < پژو سفید
 د) کامیون > پژو مشکی > پژو سفید ج) کامیون > پژو مشکی > پژو سفید



به سوالات زیر پاسخ کامل دهید

۱. وارد کردن نیرو به جسم می‌تواند باعث ایجاد ۶ تغییر در آن شود آن‌ها را نام ببرید؟

(.....)-۳

(.....)-۲

(.....)-۱

(.....)-۶

(.....)-۵

(.....)-۴

۲. شخصی با نیروی N. ۷۰۰، جعبه‌ای را روی زمین به اندازه ۵۰m می‌کشد. کار این شخص را محاسبه کنید.



۳. جرم مینا ۳۵ کیلوگرم است. هنگامی که او بالای سرسره قرار می‌گیرد، چه مقدار انرژی پتانسیل گرانشی در بدن او ذخیره می‌شود؟

۴. جدول زیر را کامل کنید.

پتانسیل شیمیایی	پتانسیل کشسانی	پتانسیل گرانشی	جنبیتی	مواد غذایی
				آسانسور متوقف شده در طبقه پنجم
				پرنده در حال پرواز
				کمان کشیده شده
				آب پشت سد
				سوخت
				تیر شلیک شده
				فرن کشیده شده
				سیب آویزان از درخت
				باتری اتومبیل

۵. با علامت <=> مقایسه کنید.

انرژی الکتریکی که از باطری به یک لامپ داده می‌شود مجموع انرژی نورانی و انرژی گرمایی که از همان لامپ خارج می‌شود.

جمله بالا شما را به یاد کدام قانون می‌اندازد. (.....)

آن قانون را توضیح دهید.

۶. در هر مورد اثر نیرو را بنویسید.

الف) اتومبیل در حال حرکت است و روی پدال گاز فشار می‌دهیم.

ب) وقتی فرن را می‌کشیم.

ج) وقتی پدال ترموماتین را فشار می‌دهیم.

د) وقتی فوتبالیست برای پنالتی به توپ ضربه می‌زند.

ه) وقتی فرمان اتومبیل را می‌چرخانیم.

۷. سجاد می‌خواهد جعبه سنگینی را بلند کند ولی نمی‌تواند.

الف) آیا سجاد انرژی مصرف کرده و نیرو وارد کرده است؟

ب) آیا کار انجام داده است؟ دلیل بیاورید؟

ج) انرژی سجاد چه می‌شود؟

۸. جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	نیرو (نیوتن)	جایه‌جایی (متر)	کار (ژول)
۱	۴۰۰	۱۶۰۰۰
۲	۴	۱۲۰۰
۳	۵۰	۶
۴	۳۰۰	۹


۹. جسمی 50N وزن دارد، اگر این جسم را با نیروی 80N نیوتونی بکشیم و این جسم را ۲ متر به جلو ببریم:

الف) کار انجام شده چقدر است؟

ب) اگر این جسم را تا ارتفاع ۴ متر از زمین بالا ببریم، کار انجام شده چقدر است؟

ج) در کدام یک از محاسبه‌ها از وزن استفاده می‌شود؟ چرا؟

۱۰. سه نوع انرژی پتانسیل را نام برد و برای هر یک مثال بزنید.



۱۱. با توجه به شکل رو به رو، به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

الف) بیشترین انرژی پتانسیل گرانشی ()


ب) کمترین انرژی پتانسیل گرانشی ()

۱۲. جدول زیر را کامل کنید.

وسیله یا پدیده	تبديل انرژی
ژنراتور
الکتریکی به نورانی
کرم شب تاب
بلندگو
صوتی به الکتریکی
شیمیابی به گرمایی
دینام دوچرخه
پنکه

”نقوا در رأس همه ارزش‌های اخلاقی است. حضرت علی(ع)”

فصل ۸ (انرژی و تبدیل‌های آن)

ردیف	سؤال
۱	جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید. انرژی و کار را با یکای اندازه می‌گیرند.
۲	انرژی پتانسیل گرانشی به و وابسته است.
۳	آب در ابتدای آبشار دارای انرژی است
۴	وقتی از کوه بالا می‌رویم انرژی به تبدیل می‌شود.
۵	انرژی ذخیره شده در خوراکی‌ها را با واحد بیان می‌کند.
۶	درست یا نادرست بودن هریک از عبارتهای زیر را تعیین کنید. مقدار کل انرژی ثابت نیست.
۷	هر کس نیروی بیشتری مصرف کند حتماً کار بیشتری انجام داده است.
۸	من و دوستم در صفت بدون حرکت ایستاده ایم کیفیت من سنگین تر است پس من کار بیشتری انجام داده ام. درست
۹	هر جسمی سنگین تر باشد و تندرت حرکت کند انرژی جنبشی بیشتری دارد.
۱۰	در کریت شعله‌ور انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی و نورانی تبدیل می‌شود.
۱۱	هریک از عبارتهای داده شده مربوط به کدام مفهوم است (آن‌ها را به هم وصل کنید) تبدیل انرژی
۱۲	● الکتریکی به صوتی ● باتری
۱۳	● الکتریکی به گرمایی ● بخاری برقی
۱۴	● الکتریکی به نورانی و گرمایی ● لامپ
۱۵	● شیمیایی به الکتریکی ● رادیو
۱۶	● الکتریکی به حرکتی ● پنکه
۱۷	در پرسش‌های زیر گزینه درست را انتخاب کنید. شخصی یک جعبه ۳۰۰ نیوتنی را روی سطح زمین با نیروی ۱۵۰ نیوتن به طول ۵ متر می‌کشد. کاری که این شخص انجام می‌دهد چقدر است؟ الف) ۷۵ ژول ب) ۷۵۰ ژول ج) ۵ ژول
۱۸	شکل مقابل کدام عامل موثر در پتانسیل گرانشی را نشان می‌دهد؟ 
۱۹	شخصی یک وزنه ۱۰ کیلوگرمی را در ارتفاع ۱ متری نگه داشته چند ژول کار را انجام داده است? الف) ۹۸۰ ژول ب) ۹۸ ژول ج) ۱۰ ژول
۲۰	اگر مقدار نیروی وارد بر یک ماشین نصف شود و مقدار جابجایی ماشین ۴ برابر شود مقدار کار انجام شده چقدر می‌شود? الف) مقدار کار ۴ برابر می‌شود ب) مقدار کار تغییر نمی‌کند ج) مقدار کار ۲ برابر می‌شود د) مقدار کار نصف می‌شود
	در عمل فتوسنتر، انرژی نورانی به انرژی تبدیل می‌شود. الف) شیمیایی ب) الکتریکی ج) جنبشی د) صوت

<p>به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.</p> <p>در انرژی جنبشی یک جسم دو عامل نقش دارد آن‌ها را نام ببرید.</p> <p>هرگاه یک گلوله نخی وصل کنیم و آن را از نقطه‌ای آویزان کنیم در این حالت به مجموعه نخ و گلوله چه می‌گویند؟</p> <p>مهم‌ترین ویژگی انرژی چیست؟</p> <p>انرژی در چه چیزهایی و در کجا وجود دارد؟</p> <p>واحد اندازه‌گیری کار چیست؟</p>	<p>۲۱</p> <p>۲۲</p> <p>۲۳</p> <p>۲۴</p> <p>۲۵</p>									
	<p>به پرسش‌های زیر پاسخ کامل دهید.</p> <p>(الف) مقدار کار کدام شماره بیشتر است؟</p> <p>(ب) کدام شماره به آسانی می‌تواند کار انجام دهد؟</p> <p>(ج) مقدار کار انجام شده توسط یکی از شماره‌ها را محاسبه کنید.</p>	<p>۲۶</p>								
	<p>انرژی پتانسیل گرانشی کدام یک بیشتر است؟ چرا؟</p>	<p>۲۶</p>								
<p>با توجه به جدول انرژی موجود در یک تخم مرغ (۶۰۰ گرم) یک گوجه فرنگی (۵۰ گرم) و یک نان لواش (۱۰۰ گرم) را حساب کنید (انرژی‌ها بر حسب کیلوژول بر گرم است)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">انرژی</th> <th style="text-align: center;">خوارکی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱۱/۳</td> <td style="text-align: center;">نان لواش</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۶/۸</td> <td style="text-align: center;">تخم مرغ (آب پز)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۰/۹</td> <td style="text-align: center;">گوجه فرنگی</td> </tr> </tbody> </table>	انرژی	خوارکی	۱۱/۳	نان لواش	۶/۸	تخم مرغ (آب پز)	۰/۹	گوجه فرنگی	<p>با توجه به جدول انرژی موجود در یک تخم مرغ (۶۰۰ گرم) یک گوجه فرنگی (۵۰ گرم) و یک نان لواش (۱۰۰ گرم) را حساب کنید (انرژی‌ها بر حسب کیلوژول بر گرم است)</p>	<p>۲۸</p>
انرژی	خوارکی									
۱۱/۳	نان لواش									
۶/۸	تخم مرغ (آب پز)									
۰/۹	گوجه فرنگی									
	<p>در شکل مقابل اتومبیل و کامیون با یک سرعت حرکت می‌کنند به نظر شما انرژی جنبشی (حرکتی) کدام یک بیشتر است؟ علت چیست؟</p>	<p>۲۹</p>								
<p>با توجه به قانون پایستگی انرژی جای خالی را روی نمودار انرژی خودرو کامل کنید.</p>	<p>در مثال‌های زیر نوع انرژی پتانسیل را بنویسید.</p> <p>(الف) انرژی ذخیره شده در بنزین</p> <p>(ب) انرژی ذخیره شده در فنر فشرده شده</p> <p>(ج) انرژی ذخیره شده در پرندۀ‌ای که روی سیم برق نشسته</p>	<p>۳۰</p>								
<p>در مثال‌های زیر نوع انرژی پتانسیل را بنویسید.</p> <p>(الف) انرژی ذخیره شده در بنزین</p> <p>(ب) انرژی ذخیره شده در فنر فشرده شده</p> <p>(ج) انرژی ذخیره شده در پرندۀ‌ای که روی سیم برق نشسته</p>	<p>۳۱</p>									

پاسخنامه فصل ۸

- ۱ - ژول
 ۴ - جنبشی به پتانسیل گرانشی
 ۶ - نادرست
 ۹ - درست
 ۱۱ - رادیو
 ۱۴ - باتری
 ۱۶ - ب
 ۱۹ - ج
 ۲۱ - جرم جسم و مقدار سرعت آن
 ۲۲ - آونگ
 ۲۳ - تبدیل آن از یک شکل به شکل دیگر
 ۲۴ - در همه چیز و همه جا
 ۲۵ - ژول
 ۲۶ - الف) هردو کار یکسانی انجام می‌دهند.
 ب) فرد سمت چپی
 ج) کار ژول $= 100 \times 50 \times 20 =$ جابجایی \times نیرو =
 ۲۷ - C زیرا مقدار انرژی پتانسیل به وزن و ارتفاع جسم بستگی دارد و چون جرم C بیشتر است پس وزنش هم بیشتر است.
 ۲۸ -
 کیلو ژول $= 60 \times 60 / 8 = 408$
 کیلو ژول $= 45 = 50 \times 0 / 9$
 کیلو ژول $= 1130 = 100 \times 11 / 3$
 $408 + 45 + 1130 = 1583 \text{ kJ}$
 ۲۹ - انرژی جنبشی کامیون بیشتر است زیرا جرم بیشتری دارد.
 ۳۰ -
 الف) انرژی پتانسیل شیمیایی
 ب) انرژی پتانسیل کشانی
 ج) انرژی پتانسیل گرانشی