


# عبارت های گویا



بلهانش اسلامی در زندگی انسان دارند. این اع مختلفی از بیل ها و جمود دارند و در معادل زیادی نیروهای انسان بر قبیلا از فرمول هایی بدست می آید که باید عبارت کویا بیان می شوند. مثلاً در معادل بلهای کافی بیان نمایند بل  
محاباتی از دستور  $\frac{L+15}{L+15} \times 2$  بدست می آید که در آن طبقه بارگذاری شده بحسب متر است.

مسئله

طول مستطیلی ۴ سانتیمتر از عرض آن بیشتر است. اگر نسبت عرض به طول این مستطیل  $\frac{2}{3}$  باشد، طول و عرض آن را به دست آورید.

اگر  $x$  را عرض مستطیل در نظر بگیریم، طول آن  $4x+4$  است و نسبت عرض به طول را می‌توان

با  $\frac{x}{x+4}$  نمایش داد؛ بنابراین:

$$\frac{x}{x+4} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow 3x = 2x + 8 \Rightarrow x = 8$$

عبارت  $\frac{x}{x+4}$  را، که نسبت دو چندجمله‌ای است، عبارت گویا می‌نامیم.

به طور کلی هر عبارت گویا، کسری است که صورت و مخرج آن چند جمله‌ای باشند.

عبارت‌های گویا در ریاضیات، علوم، پزشکی، مهندسی، اقتصاد و بسیاری از زمینه‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ به طور مثال سرعت متوسط اتومبیلی که مسیری را با سرعت  $v_1$  طی کرده و سپس از همان مسیر با سرعت  $v_2$  بازگشته است از رابطه  $\frac{v_1 v_2}{v_1 + v_2}$  به دست می‌آید که عبارت گویایی جبری است. برخی از مثال‌های دیگر از این قرار است:

$$\bar{x} = \frac{a+b}{2}$$

میانگین حسابی دو عدد

$$\frac{v_1 v_2}{v_1 + v_2} = M$$

محاسبه جرم یک جسم با سرعت  $v$  و انرژی جنبشی  $k$

با توجه به تعریف بالا عبارت‌های زیر گویا هستند:

$$\frac{2x-5}{5x^2-2x^2+1}, \quad \frac{x+5}{x-1}, \quad \frac{-a}{5}, \quad \frac{2}{5}, \quad \frac{4}{5}, \quad \frac{x-3}{4}, \quad \frac{x}{y}, \quad \frac{x^2-\sqrt{3}x+1}{9xy}$$

$$\frac{1}{x}, \quad \frac{10}{x+2}, \quad \frac{3x+\sqrt{v}}{x^2}, \quad \frac{xy^2}{(x-y)^2}, \quad \frac{x^3}{1}, \quad \frac{-a}{b}, \quad x^2+2x-7$$

اما عبارت‌های زیر گویا نیستند. (چرا؟)

$$\sqrt{xy}, \quad \frac{\sqrt{x}}{x+y}, \quad |x-y|, \quad \frac{1}{\sqrt{x-2}}$$

کدام یک از عبارت‌های زیر گویا است؟

$$\frac{\sqrt{v}}{x-1}, \frac{\sqrt{x+6}}{3}, \frac{ah}{2}, \frac{\sqrt{3+x}\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{2x}}{25}x, \frac{|x|+|y|}{x}x, \frac{x\sqrt{y+1}}{x^2}, \frac{x-5}{\sqrt{3}+1}, \frac{1}{\sqrt[3]{x}}, \frac{mn+n^2}{5-n}, \frac{14}{\frac{3-a}{2+x}}$$

فعالیت

مقدار عددی عبارت  $\frac{x+5}{x-3}$  را به ازای عددهای داده شده در جدول زیر بدست آورید:

x	-2	7	$\frac{1}{2}$	0	-1	-5
$\frac{x+5}{x-3}$	$\frac{-2+5}{-2-3} = -\frac{3}{5}$	$\frac{7+5}{7-3} = \frac{12}{4} = 3$	$\frac{\frac{1}{2}+5}{\frac{1}{2}-3} = \frac{\frac{11}{2}}{-\frac{5}{2}} = -\frac{11}{5}$	$\frac{0+5}{0-3} = -\frac{5}{3}$	$\frac{-1+5}{-1-3} = \frac{4}{-2} = -2$	$\frac{-5+5}{-5-3} = \frac{0}{-8} = 0$

به ازای  $x=3$  مخرج عبارت گویای  $\frac{x+5}{x-3}$  مساوی صفر می‌شود و همان‌گونه که از قبل می‌دانید  $\frac{8}{0}$  به عنوان عدد تعریف نمی‌شود.

برای تعیین همه مقادیری که به ازای آنها یک عبارت گویا تعریف می‌شود، باید مقادیری از متغیر را حذف کنیم که به ازای آنها مخرج کسر صفر می‌شود؛ به عبارت دیگر این مقادیر را نمی‌توان به جای متغیر در عبارت جبری قرار داد و حاصل را محاسبه کرد.

مثال: عبارت گویای  $\frac{7x^2+1}{(x-1)(x+2)}$  به ازای چه مقادیری از  $x$  تعریف نشده است؟

حل: چه مقادیری مخرج کسر را صفر می‌کند؟

برای یافتن این عدد، مخرج کسر را مساوی صفر قرار می‌دهیم؛ یعنی:

$$(x-1)(x+2) = 0$$

از طرفی وقتی حاصل ضرب چند عبارت برابر صفر شود، حداقل یکی از آنها صفر است؛ لذا:

$$\begin{cases} (x-1) = 0 \Rightarrow x = 1 \\ (x+2) = 0 \Rightarrow x = -2 \end{cases}$$

بنابراین عبارت گویای فوق به ازای  $x = 1$  و  $x = -2$  تعریف نشده است.

### کار در کلاس

هر یک از عبارت‌های زیر به ازای چه مقادیری از متغیرها تعریف نشده است؟

$$\text{الف} \quad \frac{8x+5}{2}$$

$$\text{د) } \frac{3x}{x^2+4}$$

$$\text{ب) } \frac{7+x}{x} \quad x=0$$

$$\text{ه) } \frac{x}{x^2-1} \Rightarrow x-1=0 \quad x=-1 \quad x=1$$

$$\text{ج) } \frac{2b+1}{2b-1}=0 \rightarrow b=\frac{1}{2}$$

$$\text{و) } \frac{a+5}{a^2-5a+6} \quad a^2-5a+4=0 \quad (a-1)(a-4)=0 \quad a=1 \quad a=4$$

ساده کردن یک عبارت گویا

کسر  $\frac{36}{48}$  با کسرهای  $\frac{9}{12}, \frac{6}{8}, \frac{18}{24}$  و  $\frac{3}{4}$  مساوی است. بین این کسرها  $\frac{3}{4}$  کسری است که

دیگر قابل ساده شدن نیست؛ در واقع :

$$\frac{36}{48} = \frac{3 \times 12}{4 \times 12} = \frac{3}{4}$$

در ساده کردن هر عدد گویا می‌توان صورت و مخرج را به عددی غیر صفر تقسیم کرد؛ یعنی

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0, c \neq 0)$$

به همین ترتیب برای عبارت گویای  $\frac{AC}{BC}$  داریم :

$$\frac{AC}{BC} = \frac{A}{B}$$

و  $C$  و  $B$  چند جمله‌ای هستند و  $C \neq 0$  و  $B \neq 0$ .

### فعالیت

توضیح دهید که هر یک از عبارت‌های گویای زیر چگونه ساده شده است؟ هر جا لازم است حل را کامل کنید (چگونگی استفاده از اتحادها و تجزیه را در هر مورد توضیح دهید).

$$\text{الف) } \frac{18y^4}{60y^5} = \frac{3}{10y}$$

$$\text{ب) } \frac{x^2+6x+9}{x^2+4x+3} = \frac{(x+3)(x+3)}{(x+1)(x+3)} = \frac{x+3}{x+1}$$

116

از تجزیه صورت و مخرج ایجاد شده  
درین عبارت مستقر باهم ساده شده از

از ب. م. ب. صورت و مخرج  
ایجاد شده

\*  
دسته بندی ۲

$$\frac{y-3}{3y+9} = \frac{(y+3)(y-3)}{3(y+3)} = \frac{y-3}{3}$$

$$\frac{ab^4}{2 \cdot a^2 b^3} = \frac{2b^4 \cdot ab^3}{2a^2 \cdot ab^3} = \frac{2b^4}{2a} \Rightarrow \frac{b-5}{5-b} = \frac{b-5}{-(b-5)} = -1$$

فصل های درست

### کار در کلاس

۱- عبارت های گویای زیر را ساده کنید :

$$(a+m)(a+n) \quad (b) \quad \frac{6m+18}{6m+21} = \frac{6(m+3)}{6(m+3)} = \frac{1}{1}$$

$$(d) \quad \frac{x^4-y^4}{y-x} = \frac{(x^2-y^2)(x^2+y^2)}{-(m-y)} = \frac{(m-y)(n+y)(m+y)}{-(m-y)}$$

۲- عبارت  $\frac{a+ax}{a}$  به دو شکل ساده شده؛ کدام درست و کدام نادرست است؟

الف)  $\frac{a+ax}{a} = a+x$

ب)  $\frac{a+ax}{a} = \frac{a(1+x)}{a} = 1+x$

### تمرین

۱- برای هر عبارت گویا، مقادیری را به دست آورید که عبارت به ازای آنها تعریف نشده است.

$$a, b = 0 \quad \begin{cases} a=0 \\ b=0 \end{cases} \quad \text{الف) } \frac{ax}{ab^2}$$

$$(d) \quad \frac{2x+5}{x} \quad x \neq 0$$

$$(b) \quad \frac{2y}{y(2y-6)} \quad \begin{cases} y=0 \\ y \neq 3 \end{cases}$$

$$(d) \quad \frac{x^2-1}{x+5} \quad \begin{cases} y=3 \\ x+5=0 \\ x=-5 \end{cases}$$

$$(c) \quad \frac{P^2-P-10}{P^2-P-12} \quad \begin{cases} P=4 \\ P=-4 \end{cases} \quad (P-4)(P+1) = 0$$

$$4a+1 = 0 \rightarrow a = -\frac{1}{4}$$

۲- حاصل هر عبارت را به ساده‌ترین صورت بنویسید :

$$\frac{-(m-n)}{(m-n)(n-3)} = \frac{-1}{n-2} \quad \text{الف) } \frac{3-x}{x^2-5x+6}$$

$$(b) \quad \frac{4x^2+8x}{12x+24}$$

$$(c) \quad \frac{24x^2}{12x^2-6x}$$

$$(d) \quad \frac{y^2-2y^2-3y}{y^2+y}$$

$$(e) \quad \frac{1-t^2}{t^2+1}$$

$$(f) \quad \frac{16x^2-9y^2}{8x-6y}$$

$$(b) \quad \frac{tx(x+2)}{12(x+2)} = \frac{x}{3}$$

$$(c) \quad \frac{4x^2}{4x(2x-1)} = \frac{4x}{2x-1} \quad \begin{cases} y(y^2-2y-3) \\ y(y+1) \end{cases} = \frac{y^2-2y-3}{y+1} \quad (g) \quad \frac{(1-t^2)(1+t^2)}{(1+t^2)} \\ = \frac{(y+1)(y-3)}{y+1} = 1-t^2$$

$$(e) \quad \frac{(4x-3y)(4x+3y)}{2(4x-3y)} = \frac{4x+3y}{2} \quad = y-3$$

$$j) \frac{6a^4b^3}{4ab^4} = \frac{3a^3}{2b^4} \quad j) \frac{-2a-1}{a^2+2a-1} = \frac{-1(a+1)}{(a+1)(a-1)} = \frac{-1}{a-1}$$

۳- عبارت‌هایی را که حاصل آنها ۱ و ۰ است، معلوم کنید.

الف)  $\frac{2y+3}{2y-3}$       ب)  $\frac{2y-3}{3-2y} = \frac{-(3-2y)}{3-2y} = -1$

ج)  $\frac{2y+3}{3+2y} = \frac{3+2y}{3+2y} = 1$       د)  $\frac{2y+3}{-2y-3} = \frac{2y+3}{-(2y+3)} = -1$

سؤال خودگزین ۷- هر یک از عبارت‌های داده شده در سطر اول را به عبارت مساوی آن در سطر دوم وصل کنید.

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 9 \\ 2 &\rightarrow 7 \\ 3 &\rightarrow 10 \\ 4 &\rightarrow 6 \\ 5 &\rightarrow 8 \end{aligned}$$

۱) $\frac{a-2}{a+5}$	۲) $\frac{a+2}{a-5}$	۳) $\frac{a-2}{a-5}$	۴) $\frac{a+2}{a+5}$	۵) $\frac{2-a}{a+5}$
۶) $\frac{-a-2}{-a-5}$	۷) $\frac{-a-2}{5-a}$	۸) $\frac{a-2}{-a-5}$	۹) $\frac{2-a}{-a-5}$	۱۰) $\frac{-a+2}{-a+5}$

۵- در جای خالی چه عبارتی باید نوشت؟

ب)  $\frac{3x}{x-3} = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{x^2-x-6} = \frac{3n(n+2)}{(n-3)(n+2)}$

د)  $\frac{(x-5)(\boxed{(n-1)(n+1)})}{(x-2)(x-5)} = x+1$

الف) صورت و مخرج در  $z^2 + z$  منطبق  
 $\frac{1-z}{z} = \frac{1-z}{\boxed{z^2+z}}$

ج)  $\frac{3y+2}{5} = \frac{1}{5}(\boxed{3y+2})$

۶- از عبارت‌های زیر، هر کدام را که با عبارت  $\frac{z(x+y)}{t}$  برابر است، مشخص کنید.

الف)  $\frac{z}{t}(x+y)$       ب)  $\frac{zx+y}{t}$       ج)  $\frac{1}{t} \times z(x+y)$  ✓

د)  $z \times \frac{x+y}{t}$

ه)  $\frac{zx}{t} + \frac{zy}{t}$

و)  $\frac{zx}{t} + y$

## ضرب و تقسیم عبارت‌های گویا

عبارت‌های گویا را همانند عددهای گویا می‌توان در هم ضرب یا بر هم تقسیم کرد. در مورد

عددهای گویا قوانین زیر را داریم:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad , \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

$$(b, d \neq 0) \quad (b, c, d \neq 0)$$

در ضمن در مورد عبارات گویا هم هرجا که امکان داشته باشد، می‌توان عبارت را ساده کرد.

### فعالیت

توضیح دهید که هر یک از ضرب‌ها و یا تقسیم‌های زیر چگونه انجام شده است. هرجا لازم است حل را کامل و حاصل عبارت را ساده کنید.

(الف)  $\frac{\cancel{x}y^3}{\cancel{x}^2z^2} \times \frac{\cancel{z}^2z^3}{\cancel{y}^3} = \frac{yz}{x^3}$

(ب)  $\frac{x+3}{x} \times \frac{x^2}{x^2 - 2x - 15} = \frac{\cancel{x+3}}{x} \times \frac{x^2}{\cancel{(x+5)(x-3)}} = \frac{x^2}{x-3}$

(ج)  $\frac{x-6}{x^2 - 12x + 36} \times \frac{x^2 - 3x - 18}{x^2 + 7x + 12} = \frac{\cancel{x-6}}{\cancel{(x-6)(x-6)}} \times \frac{\cancel{(x+3)(x-4)}}{\cancel{(x+3)(x+4)}} = \frac{1}{x+4}$

(د)  $\frac{4x^2}{3xy} \div \frac{8x}{y^2} = \frac{\cancel{4}x^2}{\cancel{3}xy} \times \frac{y^2}{\cancel{8}x} = \frac{y^2}{6}$

(ه) 
$$\begin{aligned} \frac{a^2 - 4a - 5}{a^2 - 4a} \div \frac{a^2 + 3a + 2}{a - 4} &= \frac{a^2 - 4a - 5}{a^2 - 4a} \times \frac{a - 4}{a^2 + 3a + 2} = \frac{(a-5)(a+1)}{a(a-4)} \times \frac{a-4}{(a+1)(a+2)} = \frac{a-5}{a(a+2)} \\ &= \frac{(a+1)(a-5)}{a(a-4)} \times \frac{a-4}{(a+1)(a+2)} = \frac{a-5}{a(a+2)} \end{aligned}$$

## کار در کالس

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

$$\frac{(a+2)(a-3)(a+3)}{(a+3)(a-2)(a+2)}$$

$$(الف) \frac{a^2 - a - 6}{a+3} \times \frac{a+3}{a^2 - 4} = \frac{a-3}{a-2}$$

$$\frac{(x+1)(x+2)}{x+2} \times \frac{x+2}{x+5}$$

$$(ج) \frac{x^2 + 3x + 2}{x+2} \div \frac{x+1}{x+5} = \frac{x+2}{1}$$

$$(ب) \frac{ab + ab^2}{a} \times \frac{3ab}{(a+b)^2} = \frac{ab(a+b) \times 3ab}{a(a+b)(a+b)} = \frac{3ab^2}{(a+b)}$$

$$(د) \frac{4x^2}{3xy} \div \frac{8x}{y^2} = \frac{4x^2}{3xy} \times \frac{y^2}{8x} = \frac{y^2}{6x^2} = \frac{y^2}{4}$$

## جمع و تفریق عبارت های گویا

جمع و تفریق عبارت های گویا مشابه جمع و تفریق عدد های گویا است؛ در مورد عدد های گویا داریم:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

$$\text{و} \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$(b \neq 0)$$

$$(b, d \neq 0)$$

به طریق مشابه می توان دو عبارت گویا را جمع یا تفریق کرد.

## فعالیت

توضیح دهد که هر یک از محاسبات زیر چگونه انجام شده است. هرجا لازم است حل را کامل، و مانند نمونه یک جمع و تفریق عددی مشابه آن ارائه کنید.

$$(الف) \frac{3x+7}{x+2} + \frac{2x-3}{x+2} = \frac{3x+7+2x-3}{x+2} = \frac{5x+4}{x+2}$$

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$$

$$(ب) \frac{3x+7}{x+2} - \frac{2x-3}{x+2} = \frac{3x+7-(2x-3)}{x+2} = \frac{x+10}{x+2}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$$

$$(ج) \frac{a^2 - 20}{a^2 - 4} + \frac{a-2}{a+2} = \frac{a^2 - 20 + (a-2)^2}{a^2 - 4} =$$

$$\frac{7}{10} - \frac{9x^2}{10x^2} = \frac{7}{10} - \frac{18}{10} = -\frac{11}{10}$$

$$= \frac{a^2 - 20 + a^2 - 4a + 4}{a^2 - 4} = \frac{2a^2 - 4a - 16}{a^2 - 4} = \frac{2(a^2 - 2a - 8)}{a^2 - 4}$$

$$\frac{a+1}{a} - \frac{3a+2}{a(a+2)} = \frac{(a+1)(a+2) - (3a+2)}{a(a+2)} = \frac{a^2 + 2a + 2 - 3a - 2}{a(a+2)} = \frac{a^2 - a}{a(a+2)} = \frac{a(a-1)}{a(a+2)} = \frac{a-1}{a+2} = \frac{\sqrt{12}}{12}$$

$$= \frac{2(a-4)(a+1)}{(a+1)(a-2)} = \frac{2(a-4)}{a-2}$$

$$(الف) \frac{x^2 - y^2}{x-y} = \frac{(x-y)(x+y)}{x-y} = x+y$$

$$(ج) \frac{mn-14-(m+4)(m-2)}{(m-2)(m+2)} = \frac{mn-14-x^2-2m+1}{(m-2)(m+2)} = \frac{x^2-2m-1}{(m-2)(m+2)} = \frac{(x-1)(x+1)}{(m-2)(m+2)} = \frac{m-1}{m+2}$$

$$*) \frac{\sqrt{m+2} + \sqrt{-2m}}{(m-2)(x+1)(m+3)} = \frac{x^2 + 3m + 21}{(m-2)(x+1)(m+3)} \quad *$$

### کار کر کالس

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. اصلاً فضای خانه برای پاسخگویی ندارد.

$$(الف) \frac{x^2 + y^2}{x-y} - \frac{y^2}{y-x}$$

$$(ب) \frac{6}{x} + \frac{4}{-x} = \frac{6}{x} - \frac{4}{x} = \frac{2}{x}$$

$$(ج) \frac{2x^2 - 16}{x^2 - 4} - \frac{(x+4)(m-2)}{(x+2)(m-2)} = \frac{2(x-4)}{(x+2)(m-2)} \quad (\text{دستگیر}) \quad \frac{v}{x^2 - x - 2} + \frac{x}{x^2 + 4x + 4} = \frac{v(m+3) + x(m-2)}{(m-2)(x+1)(m+3)}$$

$$(د) \frac{2}{3y(x-y)} + \frac{x+1}{x(x-y)^2} = \frac{2x(x-y) + 3y(x+1)}{3xy(x-y)} = \frac{2x^2 - 2xy + 3xy + 3y^2}{3xy(x-y)^2} = \frac{2x^2 + xy + 3y^2}{3xy(m-2)^2}$$

ساده کردن عبارت های مرکب

هنگام ساده کردن هر عبارت گویای مرکب، همانند کسر های مرکب می توان صورت و مخرج را جداگانه ساده و سپس آنها را برهم تقسیم کرد و یا از همان ابتدا صورت و مخرج را در عبارتی مناسب (و غیر صفر) ضرب کرد.

### فعالیت

توضیح دهد که هر یک از روش های ارائه شده برای ساده کردن کسر مرکب با روش دیگر چه تفاوتی دارد؛ هرجا لازم است حل را کامل کنید. ( $x \neq 0$ )

مدرس و مخرج در عبارت  
مناسب وغیرهمزن هذب

ست

ابدا صورت و مخرج از  
عزم متر رفت  
محل ساده شد از.

$$(الف) \frac{1 - \frac{1}{x} - \frac{6}{x^2}}{1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}} = \frac{x^2(1 - \frac{1}{x} - \frac{6}{x^2})}{x^2(1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2})} = \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4x + 3} = \frac{(x+2)(x-3)}{(x-1)(x-3)} = \frac{x+2}{x-1}$$

$$(ب) \frac{1 - \frac{1}{x} - \frac{6}{x^2}}{1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}} = \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4x + 3} = \frac{x^2 - x - 6}{x^2} \div \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2} = \frac{x^2 - x - 6}{x^2} \times \frac{x^2}{x^2 - 4x + 3} \\ = \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4x + 3} = \frac{(x+2)(x-3)}{(x-1)(x-3)} = \frac{x+2}{x-1}$$

$$(ب) \frac{-x^2 - y^2}{(x+y)(x-y)} \times \frac{(x+y)(x-y)}{x^2 + y^2} = \frac{-(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = -1$$

۵) به ضریب مختلط برها ضرب

الف)  $\frac{\frac{2}{a} - \frac{3}{a+1}}{\frac{2}{a+1} - \frac{3}{a}} = \frac{a(a+1)(\frac{2}{a} - \frac{3}{a+1})}{a(a+1)(\frac{2}{a+1} - \frac{3}{a})} = \frac{2(a+1) - 3a}{2a - 3(a+1)} = \frac{2a + 2 - 3a}{2a - 3a - 3} = \frac{2 - a}{-a - 3} = \frac{a - 2}{a + 3}$

ب)  $\frac{\frac{2}{a} - \frac{3}{a+1}}{\frac{2}{a+1} - \frac{3}{a}} = \frac{2(a+1) - 3a}{a(a+1)} \div \frac{2a - 3(a+1)}{a(a+1)} = \frac{2a + 2 - 3a}{a(a+1)} \times \frac{a(a+1)}{2a - 3a - 3} = \frac{-a + 2}{-a - 3}$   
 و  $a \neq 0$  و  $a \neq -1$

### کار در کلاس


حاصل هر عبارت را به ساده ترین صورت بنویسید.

الف)  $\frac{\frac{n}{1} - \frac{n^2}{n-m}}{1 + \frac{m^2}{n^2-m^2}} = \frac{\frac{n(n-m) - n^2}{n-m}}{\frac{n^2-m^2+m^2}{n^2-m^2}} = \frac{n^2-mn-n^2}{n^2-m^2} \div \frac{n}{n^2-m^2} = \frac{-mn}{n^2-m^2} \times \frac{(n-m)(n+m)}{n^2} =$

(ب) فضای امانت  

$$\frac{\frac{y}{x+y} - \frac{x}{x-y}}{\frac{x}{x+y} + \frac{y}{x-y}} = \frac{\frac{y(x-y) - x(x+y)}{(x+y)(x-y)}}{\frac{x(x-y) + y(x+y)}{(x+y)(x-y)}} = \frac{xy - y^2 - x^2 - xy}{(x+y)(x-y)} \div \frac{x - xy + xy + y^2}{(x+y)(x-y)} =$$

### فعالیت



طول ضلع مریع در داخل مستطیل،  
 نصف عرض مستطیل است. اگر نسبت  
 مساحت مریع به مساحت مستطیل  $\frac{5}{26}$   
 باشد، طول و عرض مستطیل را به دست  
 آورید.

حل را کامل کنید و توضیح دهید که چگونه به کمک ساده کردن عبارت گویای به دست آمده و  
 حل معادله، پاسخ به دست می آید.

$$= \text{طول ضلع مریع} \frac{x+5}{2}$$

$$= \text{مساحت مریع} \left( \frac{x+5}{2} \right)^2$$

۱۲۲

\* علمت پر ایز بای سال محیر هم باش.

$$\text{مساحت مستطيل} = \frac{(n+5)^2}{4x} = \frac{25}{4x}$$

و  $(2n+3)(x+5) = \text{مساحت مربع}$

$$\Rightarrow \frac{(x+5)^2}{2(x+5)(2x+3)} = \frac{5}{4x} \Rightarrow \frac{x+5}{4x+6} = \frac{5}{12x+18}$$

$$12x + 18 = 20x + 30 \Rightarrow 8x - 12 = 2x \Rightarrow x = 6$$

$$\text{عرض} = 5 + 3 = 8$$

$$\text{طول} = 2x + 3 = 15$$

### كار در كالس

۱- محیط هر شکل را برحسب  $x$  بدست آورید و آن را ساده کنید. ( $x > 0$ )

$$\frac{x+1}{n} + \frac{2}{4n} + \frac{4}{xn} = \frac{3x+3+2+4}{3n} = \frac{3n+14}{3n}$$

$$\frac{1x+10}{n+x} + 2x \frac{x}{n+1} = \frac{\frac{3}{x+2} 4(n+1) + 2x(n+1)}{(n+2)(n+1)} = \frac{4n+4+2n^2+4n}{(n+2)(n+1)} = \frac{2n^2+8n+4}{(n+2)(n+1)} =$$

۲- مساحت مستطيل مقابل مقابيل را برحسب  $x$  بدست آوريد.

$$(n-2)\left(\frac{x^2-n-2}{(n+1)}\right) = \frac{(n-2)(n+1)(n-2)}{n+1} = (n-2)$$

### تمرين

$$-(m+v)(m-1)$$

۱- ضرب و تقسيم های زیر را انجام دهيد.

(ب)  $\frac{m^2-49}{m+1} \div \frac{7-m}{m^2-1} = \frac{(m-7)(m+7)}{(m+1)} \times \frac{(m-1)(m+1)}{-(m-7)} =$

(د)  $\frac{1-c^2}{b^2} \times \frac{b^2}{1-2c+c^2} = \frac{(1-c)(1+c)}{b(1-c)(1-c)} = \frac{1+c}{b(1-c)}$

ج.)  $\frac{(m-2)(m-1)}{15my(m-1)} \times \frac{12y}{4(m+3)} = \frac{4(m+3)}{2my(m+3)}$



$$\begin{aligned}
 & \text{(الف)} \frac{x(x-y) - y(x-y)^2}{(x+y)(x-y)} = \frac{x(x-y)(x+y) - y(x-y)^2}{(x+y)(x-y)(x+y)} = \frac{(x-y)[x(x+y) - y(x-y)]}{(x+y)(x-y)(x+y)} = \frac{x^2+xy-xy+y^2}{(x+y)(x-y)(x+y)} \\
 & = \frac{1}{x+y} \sqrt{b) \frac{(a-b^2)(a+b)-(a^2-b^2)}{a^2-b^2}} = \frac{a^2+a^2b-b^2a-b^2-a^2+b^2}{a^2-b^2} = \frac{a^2b-b^2a}{a^2-b^2} = \frac{ab(a-b)}{(a-b)(a+b)} =
 \end{aligned}$$

$\checkmark$  (الف)  $\frac{x}{x^2+y^2} - \frac{y(x-y)^2}{x^2-y^2}$

$\checkmark$  (ج)  $\frac{a^2-b^2}{a-b} - \frac{a^2-b^2}{a^2-b^2}$

۲- جمع و تفریق های زیر را انجام دهید.

$$b) \frac{x+v}{ax-bx} + \frac{y+q}{by-ay} = \frac{x+v}{v(a-b)} - \frac{y+q}{y(a-b)} = \frac{xy+vy-xy-qv}{vy(a-b)}$$

$$d) \frac{4+x^2-2x}{2+x} - \frac{2-x}{2+x} = \frac{x^2-4-2x-2x-4-2x}{2+x} = \frac{-7x}{2+x}$$

۳- فقط یکی از عبارت های گویای زیر قابل ساده شدن است؛ آن را مشخص و ساده کنید.

$$\frac{a^2+\Delta}{a^2}, \frac{a^2+3}{3}, \frac{a^2+b^2}{a^2}, \sqrt{\frac{a^2-\Delta a}{a}} = \frac{a(a-\Delta)}{a} = a-\Delta$$

۴- از میان عبارت های زیر، هر کدام را که مساوی عبارت  $\frac{x}{y}$  است، معلوم کنید.

(الف)  $\frac{x+3}{y+3}$

(ب)  $\frac{3-x}{3-y}$

(ج)  $\frac{3x}{xy}$

(د)  $\frac{x^2}{a^2y}$

۵- عبارت  $\frac{-x+3}{x+\Delta}$  با کدام یک از عبارت های زیر برابر است؟

(الف)  $-\frac{x+3}{x+\Delta}$

(ب)  $\sqrt{\frac{x-3}{x+\Delta}}$

(ج)  $\frac{x-3}{x+\Delta}$

(د)  $-\frac{3-x}{x+\Delta}$

۶- کدام یک از عبارت های زیر به درستی ساده شده است؟

X (الف)  $\frac{a+\Delta}{a^2-2\Delta} = \frac{a+\Delta}{(a+\Delta)(a-\Delta)} = a-\Delta$

✓ (ب)  $\frac{a+\Delta}{a^2-2\Delta} = \frac{a+\Delta}{(a+\Delta)(a-\Delta)} = \frac{1}{a-\Delta}$

۷- اگر  $A=a^2-b^2$  و  $B=a^2+b^2$  و  $C=2ab$ ، حاصل عبارت  $\frac{A^2-B^2}{C^2}$  را بدست آورید.

$$\begin{aligned}
 \frac{A^2-B^2}{C^2} &= \frac{(A-B)(A+B)}{C^2} = \frac{(a^2-b^2-a^2-b^2)(a^2-b^2+a^2+b^2)}{(2ab)^2} = \frac{-4b^2 \times 2a^2}{4a^2 b^2} = -1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n &= \text{عرض} \\ 2n-1 &= \text{طول} \end{aligned}$$

$$\frac{\text{محیط}}{\text{مساحت}} = \frac{4(n+2n-1)}{n(2n-1)} = \frac{4(3n-1)}{n(2n-1)}$$

مسئلہ ۹

۸- کدام یک از تساوی های زیر، درست و کدام یک نادرست است. موارد نادرست را اصلاح کنید. (همه عبارت های جبری تعریف شده فرض می شود.)

$$\begin{array}{ll} X(a) \frac{a-b}{b-a} = \frac{a-b}{ab} \rightarrow \cancel{\frac{a-b}{b-a}} & X(b) \frac{x^3}{x^2} = x^7 \rightarrow \cancel{x^3} = \frac{1}{x^4} \\ X(c) \frac{a-v-b}{v} = \frac{a-v-b}{v} \rightarrow \cancel{\frac{a-v-b}{v}} & X(d) \frac{a-b}{b-a} = 1 \rightarrow \frac{a-b}{-(a-b)} = 1 \\ X(e) \frac{1}{a-b} = \frac{-1}{a+b} \rightarrow \frac{-1}{b-a} & \checkmark \frac{a^2-b^2}{a-b} = a+b \\ X(f) \frac{ca+cb}{c+cd} = \frac{a+b}{d} \rightarrow \frac{a+b}{1+d} & \checkmark \frac{a}{b} = \frac{c}{b} \\ & c \end{array}$$

الف ۱۰

۹- طول مستطیلی از دو برابر عرض آن یک واحد کمتر است. نسبت محیط به مساحت این مستطیل را به صورت یک کسر گویا (عبارت گویا) بنویسید. با

۱۰- حاصل عبارت های زیر را بدست آورید و نتیجه را ساده کنید.

$$\frac{-\alpha(\alpha-1)}{(\alpha-1)(\alpha+1)} \div \frac{\alpha-\alpha(\alpha+1)}{(\alpha+1)} \quad \text{الف}$$

$$\frac{-\alpha}{\alpha+1} \times \frac{\alpha+1}{\alpha-\alpha^2-\alpha-\alpha^2} = \frac{-\alpha}{\alpha+1} = \frac{a-a^2}{a^2-1}$$

$$\frac{2m(n-1)+(n+1)-2(n^2-1)}{(n+1)(n-1)} \quad \text{ج}$$

$$= \frac{2m^2-2m+n+1-2n^2+2}{(n+1)(n-1)} = \frac{-n+3}{n+1}$$

$$\frac{x-2}{8m} \times \frac{8m}{\alpha+\nu}$$

$$\begin{aligned} (b) \frac{1}{x-y} - \frac{2}{x+y} &= \frac{x+y-2m+2y}{(x-y)^2} \times \frac{(m-2)}{x^2-9y^2} = \\ &= \frac{(m-2)(m-2)}{(m+2)(m-3y)(m+3y)} = \frac{-(m-2)}{(x+y)(m+3y)} \end{aligned}$$

۱۱- دو عبارت گویا بنویسید که :


الف) حاصل ضرب آنها  $\frac{a-2}{a+2}$  شود.

ب) حاصل جمع آنها  $\frac{a-2}{a+2}$  شود.

۱۲- طول مستطیل مقابل را بر حسب  $x$  بدست آورید.

مساحت مستطیل  $-x^4$  است.

$$\frac{x^4-x-12}{x-4} = \frac{(m-4)(m+3)}{(m-4)} = m+3$$



$$125 \quad \text{طول} = \frac{\text{مساحت}}{\text{عرض}} = \frac{(x-3)(x+3)}{x+3} = x-3$$

## ۱- تقسیم یک جمله‌ای بر یک جمله‌ای

- برای تقسیم دو یک جمله‌ای بر یکدیگر از قوانین ساده کردن کسرها و نیز قوانین مربوط به ساده کردن توانها استفاده می‌کنیم.

$$\frac{14x^5y}{2x^2y^3} = \frac{7x^3}{y} \quad \text{و} \quad \frac{-18a^2xz^4}{27x^6z} = \frac{-2a^2z^3}{3x^5}$$

مثال

## ۲- تقسیم چند جمله‌ای بر یک جمله‌ای

اگر  $a$  و  $b$  و  $c$  اعدادی صحیح و عددی صحیح و غیر صفر باشد، داریم:

$$\frac{a+b+c}{d} = \frac{a}{d} + \frac{b}{d} + \frac{c}{d}$$

به طور مشابه برای تقسیم چند جمله‌ای  $12x^3 - 18x^2 + 2$  بر  $6$  بروش زیر عمل می‌کنیم:

$$\frac{12x^3 - 18x^2 + 2}{6} = \frac{12x^3}{6} - \frac{18x^2}{6} + \frac{2}{6} = 2x^3 - 3x^2 + \frac{1}{3}$$

## فناوری

توضیح دهید که هر یک از تقسیم‌های زیر چگونه انجام شده است؛ جاهای خالی را پر و حل را کامل کنید.

$$\frac{2a^4 + 5a^3 - 8a}{4a^2} \quad (\text{الف}) \quad \text{هر دو ام بیموره حد احمد اتم}$$

$$\begin{aligned} \frac{14x^3yz - 6xy + 3x^2y^2z^2}{2x^2y^2z} &= \frac{14x^3yz}{2x^2y^2z} - \frac{6xy}{2x^2y^2z} + \frac{3x^2y^2z^2}{2x^2y^2z} \\ &= \frac{7x}{y} - \frac{3}{myz} + \frac{3z}{2} \end{aligned} \quad (\text{ب})$$

$$\begin{aligned} \frac{(8y^3 - 4y^2 + 12y) \div (-4y^2)}{-4y^2} &= \frac{8y^3 - 4y^2 + 12y}{-4y^2} \\ &= \frac{-2y^3}{-4y^2} - \frac{-4y^2}{-4y^2} + \frac{12y}{-4y^2} = -2y + 1 - \frac{3}{y} \end{aligned} \quad (\text{ج})$$

## کار در کلاس

تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

$$(الف) \frac{-21a^7b^4c}{28ab^6} = -\frac{3a^4c}{4b^2}$$

$$(ب) \frac{24x^6y - 2z + 3xyz}{x^2z} = \frac{24x^4y}{z} - \frac{2}{x} + \frac{3y}{x}$$

۳- تقسیم چند جمله‌ای بر چند جمله‌ای  
اگر تقسیم مقابل را در نظر بگیریم: مقسوم علیم  $\overline{26}$   $\longrightarrow$   $\overline{8}$   $\longrightarrow$   $\overline{24}$   $\longrightarrow$   $\overline{3}$   
خارج قسمت  $\overleftarrow{\overrightarrow{2}}$   $\overleftarrow{\overrightarrow{3}}$  باقی نزدیکی  $\overleftarrow{\overrightarrow{2}}$   $\overleftarrow{\overrightarrow{3}}$

عدد ۲۶ را مقسوم، ۸ را مقسوم علیه، ۳ را خارج قسمت و ۲ را باقی مانده می‌نامیم. رابطه‌های تقسیم بالا به صورت زیر است:

$$\begin{cases} 3 \times 8 + 2 = 26 \\ 2 < 8 \end{cases}$$

مثال: چند جمله‌ای  $15 - 7x^3 - 2x^2$  را بر چند جمله‌ای  $x - 5$  تقسیم کنید.

چند جمله‌ای  $15 - 7x^3 - 2x^2$  را مقسوم و  $x - 5$  را مقسوم علیه می‌نامیم. در اولین گام باید مقسوم و مقسوم علیه را بر حسب توان‌های نزولی متغیر موجود (در اینجا  $x$ ) مرتب کرد. در مثال ما چند جمله‌ای‌های مورد نظر مرتب شده هستند.

اکنون اولین جمله مقسوم را بر اولین جمله مقسوم علیه تقسیم می‌کنیم؛ یعنی:  $\frac{2x^2}{x} = 2x$

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 7x - 15 \quad | \quad x - 5 \\ + 2x^2 - 10x \\ \hline 0 \end{array}$$

حاصل ضرب  $2x$  در  $x - 5$  را بدست می‌آوریم و آن را از عبارت مقسوم کم می‌کنیم:

$$2x^2 - 7x - 15 - (2x^2 - 10x) = 2x^2 - 7x - 15 + 10x = +3x - 15$$

برای آسان‌تر شدن، می‌توانیم پس از محاسبه حاصل ضرب  $2x$  در  $x - 5$ ، در کادر بالا علامت عبارت حاصل را فرینه کنیم و محاسبه را انجام دهیم؛ یعنی:

داخل کادر:

$$\begin{array}{r} \cancel{3x^2} - 7x - 15 \\ + \cancel{3x^2} - 10x \\ \hline - + \\ \hline 3x - 15 \end{array} \quad | \quad \begin{array}{c} x-5 \\ 2x \end{array}$$

اکنون دوباره  $3x-15$  را بر  $x-5$  تقسیم و مراحل قبل را تکرار می‌کنیم؛ یعنی اولین جمله عبارت  $3x-15$  را بر اولین جمله  $x-5$  تقسیم می‌کنیم. توجه داریم که این چند جمله‌ای‌ها نیز باید

$$\frac{3x}{x} = 3$$

بر حسب نوان‌های ترولی مرتب شده باشند؛ داریم :

این تقسیم‌ها را تارمانی ادامه می‌دهیم که یا باقیمانده صفر شود یا درجه چند جمله‌ای باقیمانده از درجه مقسوم‌علیه کمتر شود.

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 7x - 15 \\ \pm 2x^2 \pm 10x \\ \hline - 15 \\ \pm 2x \pm 10 \\ \hline . \end{array} \quad | \quad \begin{array}{c} x-5 \\ 2x+3 \end{array}$$

وقتی باقیمانده صفر باشد، می‌گوییم مقسوم‌علیه بخش‌پذیر است.

### فعالیت

۱- تقسیم‌های زیر را انجام دهد و مراحل کار را توضیح دهد. جاهای خالی را پر و حل را کامل کنید.

(الف)

$$\begin{array}{r} 4x^3 - 3x^2 + x + 7 \\ \pm 4x^3 \quad \pm 8x \\ \hline - 3x^2 + 9x + 7 \\ \frac{- 3x^2}{\quad \quad \quad \boxed{9}} \\ \hline \boxed{9x} + 1 \end{array} \quad | \quad \begin{array}{c} x^2 - 2 \\ \boxed{4x} - 3 \end{array}$$

$$\frac{4x^3}{x^2} = 4x$$

در جمله‌های اول باقیمانده از درجه مقسوم‌علیه کمتر شده

باقیمانده این تقسیم چیست؟  
 $9x + 1$

(ب)

$$\begin{array}{r} x^2 - 5x - 24 \\ + x^2 - 8x \\ \hline - 3x - 24 \\ + 3x - 24 \\ \hline . \end{array} \quad | \quad \begin{array}{c} x-8 \\ \boxed{x} + \boxed{3} \end{array}$$

$$\frac{x^2}{x} = x$$

$$\frac{3x}{x} = 3$$

باقیمانده از درجه مقسوم‌علیه کمتر شده

مرين سوال ۱۲۹

8.

$$\begin{array}{r} x^2 \\ x - 2V \\ + 2x \\ \hline 2x^2 - 2V \\ 2x^2 - 2m \\ \hline m - V \\ \underline{-m + 1} \\ -19 \end{array}$$

9.

$$\begin{array}{r} m^2 + 2m^2 - 2m + 2m + m^2 \\ m^2 + 4m^2 \\ \hline -m^2 - 2m^2 + 2m^2 - 2m + m^2 \\ -m^2 + m^2 \\ \hline x^2 + m^2 - m^2 + m^2 \\ -x^2 + 2m^2 \\ -x^2 - 2m + m^2 \\ \hline -m^2 + m^2 \\ +m^2 \\ \hline +m^2 \\ +m^2 \end{array}$$

١٢

$$\begin{array}{r} m^2 - m^2 + m^2 + m + 0 \\ m^2 - m^2 \\ \hline + m^2 - m^2 + m^2 + 0 \\ -m^2 + m^2 \\ \hline m^2 + m^2 + 0 \\ \pm m^2 \\ \hline + m^2 + m^2 + 0 \\ -m^2 + m^2 \\ \hline m^2 + 0 \\ \pm m^2 \\ \hline \end{array}$$

(اب)  $(-m+1)(-m^2 - m^2 - m^2 - m - m - 1) + V$

$x(m+1) = x^2 + xm$  ٣ سوال

مربع =  $\frac{\text{مجموع طبقات المربع}}{\text{طريق المربع}}$

$$\begin{array}{r} 2x^2 + 10x^2 + 20m \\ 2m + 10m \\ \hline 12x^2 + 20m \\ 12m + 20m \\ \hline 24m + 20m \\ \vdots \vdots \end{array}$$

$m + V$  عرض

$$\begin{array}{r} 2x^2 + 4m^2 - 10x + 0 \\ 2x^2 + 10x \\ \hline 10x^2 - 10x + 0 \\ 10x^2 + 4m \\ \hline -14m + 0 \\ -14x + 0 \\ \hline 0 + 0 \\ 0 + 0 \end{array}$$

حراءه بور  $m+1=0$  لـ

$m = -1$

@ GamBee

Darsi

الف

$$\begin{array}{r} 4x^3 - 19x^2 + 14x - 4 \\ \underline{-4x^3 + 12x^2} \\ \hline -7x^2 + 14x - 4 \\ \underline{-7x^2 + 14x} \\ \hline 2x - 4 \\ \underline{2x - 4} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -x^3 + 8x^2 - 12 \\ \underline{-x^3 + 4x^2} \\ \hline 4x^2 + 8x - 12 \\ \underline{4x^2 + 8x} \\ \hline -12 \\ \underline{-12} \\ \hline 0 \end{array}$$

ب)  $x^3 - 19x^2 + 14x - 4$

۲- تقسیم زیر را انجام دهید و رابطه تقسیم را بنویسید. حل را کامل کنید.

$$\begin{array}{r} 10x^4 - 3x^3 + 2x - 19 \\ \underline{10x^4 - 3x^3} \\ \hline 2x - 19 \\ \underline{2x} \\ \hline 18 \end{array}$$

رابطه های تقسیم:

$$\frac{(5x^3 + \boxed{9})(2x^2 - 3) + 2x - \boxed{1}}{5x^3 + \boxed{9}}$$

و درجه چند جمله ای  $\boxed{1}$  از  $2x - \boxed{1}$  درجه  $-3$  کمتر است.

### گارلکس

تقسیم های زیر را انجام دهید.

$$6x^3 - 19x^2 + 16x - 4 \quad | \quad 2 - x \quad \text{(الف)}$$

$$x^3 - 12 + 8x \quad | \quad x + 6 \quad \text{(ب)}$$

### تمرین

۱- تقسیم های زیر را انجام دهید.

$$\frac{-2x^3y^3z^4}{18xz^5} = \frac{-x^3y^3z^2}{9} \quad \text{(الف)}$$

$$\frac{2a^3y^2 - a^4y^2 + 15xy}{-5y^2} = -\frac{2a^3}{5y} + \frac{a^4}{5} - \frac{3a}{y} \quad \text{(ب)}$$

$$(x^2 - 27) \div (x - 2) \quad \text{(ج)}$$

$$(3y^2 - 10y - 24) \div (3y - 4) \quad \text{(د)}$$

$$2x^5 + 5x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 3 \quad | \quad x + 3 \quad \text{(ه)}$$

علا در صفحه قبل

۲- خارج قسمت و باقیمانده تقسیم زیر را مشخص کنید و درستی عمل تقسیم را با نوشتن روابط تقسیم نشان دهید.

$$-3x^4 + 4x^6 + x^2 + 5 \quad | \quad 1 - x \quad \text{در صفحه قبل}$$

۳- حجم یک جعبه به شکل مکعب مستطیل برابر با  $20x^7 + 23x^6 + 15x^5 + 28x^4$  است. اگر ارتفاع این

جعبه  $x$  و طول آن  $x+4$  باشد، عرض آن را بدست آورید.

۴- اگر چند جمله ای  $-10x^3 + a - 4x + 3$  بر  $20x^7 + 23x^6 + 15x^5 + 28x^4$  بخش پذیر باشد،  $a$  را بدست آورید.

۵- خارج قسمت و باقیمانده تقسیم عبارت  $2x^7 - 9x^6 + 9$  بر  $2x^3 - 9x^2 + 9$  را بر هر یک از عبارت های زیر بدست آورید.

$x+3$  و  $x-3$  و  $2x+3$  و  $2x-3$

$$\begin{array}{r} 2x^4 - 9x^3 + 9 \\ \underline{2x^4 + 4x^3} \\ \hline -13x^3 + 9 \\ \underline{-13x^3 - 13x^2} \\ \hline 22x^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 9x + 9 \\ \underline{2x^2 + 3x} \\ \hline -12x + 9 \\ \underline{-12x - 18} \\ \hline 27 \end{array}$$