

## بسمه تعالی

### درس نامه و نکات کلیدی و حل تمرین های فصل هفتم پایه هشتم

سمیه انصاری-عبداللهادی آرامی-عبدالله بهزادی

## درس اول: یادآوری

✓ نکته: عدد یک به توان هر عددی برسد، حاصلش برابر یک است.  $1^4 = 1$  ،  $1^7 = 1$  ،  $1^{15} = 1$  .

✓ نکته: هر عدد به غیر از صفر به توان صفر برسد، حاصلش برابر با یک است.

✓ نکته: صفر به توان هر عددی به غیر از صفر برسد، حاصلش صفر است.  $0^5 = 0$  .

✓ نکته: هر عدد به توان یک برسد، حاصلش خود عدد می شود.  $a^1 = a$  .

✓ نکته: هر عدد توان نداشته باشد، توان آن یک است.

✓ نکته: اگر یک عدد دارای بیش از یک توان باشد و بین آن ها پرانتز وجود داشته باشد توانها در هم

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$
 ضرب می شوند.

$$(5^2)^3 = 5^6$$
 مثال )

نکته: توان دوم یک عدد همان مجذور یا مربع آن عدد است.

$$(0.1)^2 = 0.01$$
 مثال )

✓ نکته: توان سوم هر عدد را مکعب آن عدد می نامند.

✓ نکته: اگر یک کسر با پرانتز به توان برسد توان هم برای صورت است و هم برای مخرج .

$$\frac{a^n}{b^n} \neq \frac{a^n}{b^n}$$
 اما با کسری که بدون پرانتز به توان برسد مساوی نیست.  $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} \quad \text{و} \quad \frac{3^2}{4} \neq \frac{9}{16} \quad \left(\frac{3}{4}\right)^2 \neq \frac{3^2}{4} \quad \text{(مثال)}$$

✓ نکته: هر گاه یک عدد منفی داخل پرانتز به توان زوج برسد، حاصلش مثبت می‌شود.



$$(-3)^2 = +9 \quad \text{(مثال)}$$

✓ نکته: هر گاه یک عدد منفی بدون پرانتز به توان زوج برسد، حاصلش منفی می‌شود.

$$-3^2 = -9 \quad \text{(مثال)}$$

✓ نکته: هر گاه یک عدد منفی با پرانتز و یا بدون پرانتز به توان فرد برسد، حاصلش منفی می‌شود.

$$(-2)^3 = -8 \quad \text{(مثال)}$$

### قوانين ضرب اعداد توان دار:

$$1) a^m \times a^n = a^{m+n} \quad \Rightarrow \quad 5^7 \times 5^3 = 5^{7+3} = 5^{10} \quad \text{مثال}$$

$$2) a^m \times b^m = (a \times b)^m \quad \Rightarrow \quad 6^3 \times 2^3 = 12^3 \quad \text{مثال}$$

✓ نکته: اگر در ضرب و تقسیم اعداد تواندار پایه‌ها و توان‌ها هیچ‌کدام برابر نباشد، در برخی موارد می‌

توان با تجزیه پایه‌ها به ضرب عده‌های اول، آنها را با هم برابر کرد.

$$2^5 \times 4^3 = 2^5 \times (2^2)^3 = 2^5 \times 2^6 = 2^{11} \quad \text{(مثال)}$$

برای یادگیری بهتر کار در کلاس و تمرین‌های درس اول را حل کنید.



## درس دوم: تقسیم اعداد توان دار

تقسیم دو عدد توان دار با پایه های مساوی: یکی از پایه ها نوشته، توانها را از هم کم می کنیم.

$$3) a^m \div a^n = a^{m-n} \quad (a \neq 0) \quad \text{مثال} \Rightarrow 5^8 \div 5^2 = 5^{8-2} = 5^6$$

تقسیم دو عدد توان دار با توان های مساوی: یکی از توان ها نوشته، پایه ها را برهم تقسیم می کنیم.

$$4) a^m \div b^m = \left(\frac{a}{b}\right)^m, \quad (b \neq 0) \quad \text{مثال} \Rightarrow (-8)^2 \div (-4)^2 = (-2)^2 = 2^2$$

✓ **نکته:** اگر تعدادی عدد توان دار یکسان با هم جمع شوند از خاصیت ضرب استفاده کرده، یکی از

اعداد را نوشته و در تعداد ضرب می کنیم

$$3^7 + 3^7 + 3^7 = 3 \times 3^7 = 3^8 \quad \text{مثال}$$

برای یادگیری بهتر کار در کلاس و تمرین های درس دوم را حل کنید.



## درس سوم: جذر تقریبی

✓ **نکته:** ریشه دوم مثبت یک عدد را با علامت  $\sqrt{\phantom{x}}$  (رادیکال) نشان می‌دهیم و به آن جذر یک عدد می‌گوییم.

$$\sqrt{0.04} = 0.2 \quad \sqrt{36} = 6 \quad \sqrt{64} = 8 \quad (\text{مثال})$$

✓ **نکته:** اعداد منفی ریشه دوم (جذر) ندارند. به عنوان مثال  $\sqrt{-36}$  جذر ندارد.

✓ **نکته:** اگر تعداد ارقام اعشاری زوج باشد، زمانی که جذر گرفته می‌شود تعداد رقمهای اعشارش نصف می‌شود.

$$\sqrt{0.0001} = 0.01 \quad (\text{مثال})$$

✓ **نکته:** جذر برخی اعداد دقیق نیست و به صورت اعشاری است. برای به دست آوردن مقدار جذر آن -ها مانند مثال زیر عمل می‌کنیم.

مثال) جذر تقریبی عدد  $\sqrt{28}$  را حساب می‌کنیم:

جذر عدد  $\sqrt{28}$  بین دو جذر دقیق  $\sqrt{25}$  و  $\sqrt{36}$  قرار دارد.

ابتدا عدد وسط بین ۵ و ۶ را که عدد  $5/5$  است در نظر گرفته و عدد ۲۸ را با مجذور  $5/5$  مقایسه می‌کنیم.

$$(5/5)^2 = 30/25 \rightarrow 28 < 30/25$$

بین  $5/5$  و ۵ است.

عدد	۵	$5/1$	$5/2$	$5/3$	$5/4$	$5/5$
مجذور	۲۵	۲۶/۰۱	۲۷/۰۴	۲۸/۰۹	۲۹/۱۶	۳۰/۲۵

عدد ۲۸ بین مجذور  $\frac{5}{2}$  و  $\frac{5}{3}$  قرار دارد.  $27/4 < 28 < 29$  ولی چون به  $\frac{5}{3}$  نزدیک‌تر است، در

$$\sqrt{28} \simeq \frac{5}{3}$$
 نتیجه مقدار  $\sqrt{28}$  تقریباً برابر است با  $\frac{5}{3}$  یعنی

نکات جذر:

✓ **نکته:** جذر عدد صفر، خود عدد صفر می‌شود.

✓ **نکته:** جذر عدد یک، خود عدد یک می‌شود.

✓ **نکته:** جذر اعداد کوچک‌تر از واحد (بین صفر و یک)، از خود آن‌ها بزرگ‌تر است.

$$\sqrt{0/36} = 0/6$$

✓ **نکته:** جذر اعداد بزرگ‌تر از واحد (بزرگ‌تر از یک)، از خود عدد کوچک‌تر است.

$$\sqrt{36} = 6 \quad 36 > 6 \quad \text{مثال)$$

**مثال)** عدد  $3 + \sqrt{17}$  بین کدام دو عدد صحیح متوالی است؟

$$\sqrt{16} < \sqrt{17} < \sqrt{25} \rightarrow 4 < \sqrt{17} < 5 \rightarrow 3 + 4 < 3 + \sqrt{17} < 3 + 5 \rightarrow 7 < 3 + \sqrt{17} < 8$$

بنابراین عدد  $3 + \sqrt{17}$  بین اعداد ۷ و ۸ قرار دارد.

برای یادگیری بهتر کار در کلاس و تمرین‌های درس سوم را حل کنید.




## درس چهارم: نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد

نمایش اعداد رادیکالی روی محور: برای نمایش اعداد رادیکالی که جذر کامل ندارند، از مثلث های

قائم الزاویه و رابطه فیثاغورس استفاده می کنیم به طوری که وتر مثلث برابر با عدد رادیکالی باشد.

**مثال ۱)**  $\sqrt{2}$  را روی محور رسم کنید.

$$x = \sqrt{2} \rightarrow x^2 = 1^2 + 1^2 \Rightarrow x = \sqrt{1^2 + 1^2}$$



بنابراین مثلث قائم الزاویه ای با اضلاع قائم ۱ رسم می کنیم. وتر این مثلث  $\sqrt{2}$


است. مثلث را روی محور رسم کرده، سوزن پرگار را روی صفر قرار داده و دهانه پرگار را به اندازه وتر باز

کرده و کمان می زنیم. اگر  $\sqrt{2} + \sqrt{2}$  باشد کمان به سمت مثبت محور رسم می شود و اگر  $-\sqrt{2}$  باشد کمان

به سمت منفی محور رسم می شود.


**مثال ۲)**  $\sqrt{3}$  را روی محور رسم کنید.

$$x^2 = 1^2 + 1^2 \rightarrow y^2 = x^2 + 1 \rightarrow y^2 = \sqrt{2}^2 + 1^2 = 2 + 1 = 3 \rightarrow y = \sqrt{3}$$



**تذکر:** دهانه پرگار را به اندازه آخرین وتر باز می کنیم.

**تذکرہ:** برای رسم عبارت‌هایی مثل  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  باید از نقطه ۳ پاره خطی به اندازه  $\sqrt{2}$  را رسم کرده و چون  $\sqrt{2}$  مثبت است به سمت مثبت کمان می‌زنیم.



## خواص ضرب و تقسیم رادیکال‌ها

**نکته ۱:** اگر بین دو رادیکال جمع یا تفریق باشد نمی‌توانیم اعداد آن‌ها را زیر یک رادیکال ببریم.

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b} \quad \sqrt{a} - \sqrt{b} \neq \sqrt{a-b}$$

**نکته ۲:** اگر دو رادیکال در هم ضرب شده باشند می‌توانیم اعداد آن‌ها را زیر یک رادیکال ببریم و برعکس.

( ) و  $a$  و  $b$  نامنفی هستند)

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} \quad \sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

**نکته ۳:** اگر دو رادیکال بر هم تقسیم شده باشند می‌توانیم یک رادیکال نوشته و اعداد را بر هم تقسیم کنیم و برعکس.

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

**تذکرہ:** اگر بین اعداد زیر رادیکال عملیات جمع یا تفریق باشد، ابتدا حاصل را به دست آورده و سپس جذر می‌گیریم.

$$\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5 \quad \text{مثال) حاصل عبارت مقابله را به دست آورید.}$$

## محاسبه و ساده کردن رادیکال از راه تجزیه و اعداد مربع کامل طبیعی

اعداد مربع کامل طبیعی : به اعدادی که جذر آنها یک عدد طبیعی است مربع کامل طبیعی میگوییم .

مانند  $\sqrt{25}$  و  $\sqrt{36}$

عدد زیر رادیکال را تجزیه کرده و به صورت حاصل ضرب دو عدد طبیعی که یکی از آنها مربع کامل است، مینویسیم. سپس از اعداد مربع کامل جذر گرفته و به صورت ضریب مینویسیم.

$$\sqrt{75} = \sqrt{3 \times 25} = \sqrt{25} \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

به عنوان مثال:

$$\sqrt{20} = \sqrt{2^2 \times 5} = \sqrt{2^2} \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$$

**جمع و تفریق رادیکال‌ها:** جمع و تفریق رادیکال‌ها فقط برای رادیکال‌های متشابه انجام می‌شود. بدین صورت که ضرایب آن‌ها با هم جمع یا تفریق می‌گردند.

**رادیکال‌های متشابه** به رادیکال‌هایی گفته می‌شود که پس از ساده شدن، اعداد زیر رادیکال آنها یکسان باشند.

مثال)  $5\sqrt{3}$  و  $-2\sqrt{3}$  - متشابه هستند اما  $5\sqrt{3}$  و  $5\sqrt{2}$  متشابه نیستند.

**تذکر<sub>۱</sub>:** قبل از جمع یا تفریق کردن رادیکال‌ها، آنها را باید ساده کرد . بدین صورت رادیکال‌های متشابه مشخص می‌شوند.

**تذکر<sub>۲</sub>:** اگر عدد صحیحی در یک عبارت رادیکالی ضرب شود فقط در ضریب آن ضرب می شود. مثال

$$-3(2\sqrt{5}) = -6\sqrt{5}$$

**مثال<sub>۱</sub>)** حاصل عبارت زیر را به ساده‌ترین شکل ممکن بنویسید.

$$3\sqrt{2} + 4\sqrt{3} - 7\sqrt{2} + \sqrt{3} = -4\sqrt{2} + 5\sqrt{3}$$

**مثال ۲** رادیکال زیر را ساده کنید.

$$\sqrt{28} = \sqrt{4 \times 7} = \sqrt{4} \times \sqrt{7} = 2\sqrt{7}$$

**مثال ۳** حاصل عبارت زیر را به ساده‌ترین شکل ممکن بنویسید.

$$\begin{aligned} 5\sqrt{28} + \sqrt{32} - 4\sqrt{7} + \sqrt{18} &= 5 \times 2\sqrt{7} + 4\sqrt{2} - 4\sqrt{7} + 3\sqrt{2} \\ &= 10\sqrt{7} - 4\sqrt{7} + 4\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 6\sqrt{7} + 7\sqrt{2} \end{aligned}$$

برای یادگیری بهتر کار در کلاس و تمرین‌های درس چهارم را حل کنید.

